

不定値計量の局所対称空間の
大域幾何と解析

小林俊行

東京大学大学院数理科学研究科・カブリ数物連携宇宙研究機構
http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~toshi/

第 65 回幾何学シンポジウム
東北大学, 2018 年 8 月 28-31 日

幾何学—局所から大域へ

基本問題 (微分幾何)

局所 幾何構造 がどのように

A
多様体の 大域的な 性質 に影響を与えるか?
B

A (局所的性質): 曲率, 局所的均質構造, ...

B (大域的性質): 体積, コンパクト性, 基本群, ...

曲率 (局所的性質) \rightsquigarrow 大域的性質?

• リーマン幾何の場合

- 正曲率



例. Bonnet-Myers の定理 (大域的制約)

- 負曲率

例. 双曲幾何

$$\Sigma_g = \underbrace{\circlearrowleft \circlearrowleft \dots \circlearrowleft}_{g \text{ times}} \simeq \pi_1(\Gamma_g) \backslash SL(2, \mathbb{R}) / SO(2)$$

• ローレンツ幾何の場合

- 正曲率

例. ド・ジッター多様体 に対する Calabi-Markus 現象

- 負曲率

例. コンパクトな 反ド・ジッター多様体 の存在問題

リーマン幾何の“正値性”を越えて


M : n 次元多様体

定義 (M, g) が 擬リーマン多様体 であるとは
 $g: T_x M \times T_x M \rightarrow \mathbb{R}$
が $x \in M$ に C^∞ 級に依存する
非退化対称双線型形式であるときをいう。

(p, q) : g の符号は局所定数, $p + q = n$
 $q = 0$ のとき (M, g) を リーマン多様体,
 $q = 1$ のとき (M, g) を ローレンツ多様体 という。

局所等質空間 $\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$

設定 $\Gamma \subset G \supset H$
 離散部分群 リー群 閉部分群



- $\Gamma \backslash G$ および $X = G/H$ は C^∞ 多様体である (easy).
- しかし, 商空間 $\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$ はハウスドルフとは限らない. ただし, Γ が X に固有不連続かつ自由に作用する場合は, $\Gamma \backslash G/H$ は (ハウスドルフな) C^∞ 多様体となり, p_Γ は被覆写像となる.

定義. $\Gamma \backslash X \simeq \Gamma \backslash G/H$ を G/H の Clifford-Klein 形 という.

擬リーマン局所等質多様体

離散等長部分群 \Leftrightarrow 固有不連続な等長作用

(擬リーマン多様体の場合)

基本問題
 均質 幾何 構造がどのように, 多様体の **大域的性質** に影響するか?


新しい現象と手法は?

離散群によるコンパクトハウスドルフ商の存在問題

$(\Gamma \subset) G \supset H$
 離散 リー群 閉部分群

問題 (K-'87) どのようなリー群の組 (G, H) に対して以下の性質をみたす G の離散部分群 Γ が存在するか?
 • $\Gamma \curvearrowright G/H$ は固有不連続かつ自由,
 • $\Gamma \backslash G/H$ はコンパクト (あるいは体積有限).

古典的な場合: H はコンパクト
 \Rightarrow 数論的部分群の理論により G が線型簡約群ならばこのような Γ は常に存在する (Borel-Harish-Chandra, Mostow-玉河)



離散群によるコンパクトハウスドルフ商の存在問題

$(\Gamma \subset) G \supset H$
 離散 リー群 閉部分群

問題 (K-'87) どのようなリー群の組 (G, H) に対して以下の性質をみたす G の離散部分群 Γ が存在するか?
 • $\Gamma \curvearrowright G/H$ は固有不連続かつ自由,
 • $\Gamma \backslash G/H$ はコンパクト (あるいは体積有限).


“古典的”ではない場合: H は **非コンパクト**.

\Rightarrow 状況は大きく異なる

予想 $n > m$ のとき $SL(n)/SL(m)$ にはこのような Γ は存在しない.


SL(n)/SL(m) のコンパクト商の非存在予想

コンパクト商の非存在予想が証明されたケース (1990–2017):




SL(n)/SL(m) のコンパクト商の非存在予想

コンパクト商の非存在予想が証明されたケース (1990–2017):



SL(n)/SL(m) のコンパクト商の非存在予想

コンパクト商の非存在予想が証明されたケース (1990–2017):



コンパクト商の非存在予想の証明の手法

予想 $SL(n)/SL(m)$ ($n > m > 1$) には不連続群によるコンパクト商は存在しない.

K-	作用の固有性判定条件 + コホモロジーによる障害	$n > \frac{3}{2}m + 2$
Zimmer	Ratner の軌道閉包定理	$n > 2m$
Labourier-Mozes-Zimmer	エルゴード作用	$n \geq 2m$
Benoist	固有性判定条件	$n = m + 1, m$ even
Margulis	ユニタリ表現論	$(n \geq 5, m = 2)$
Shalom	ユニタリ表現論	$n \geq 4, m = 2$

基礎概念の復習... 固有な作用

作用
 $L \curvearrowright X$
 位相群 局所コンパクト空間

$X \subset L$
 部分集合 $U \rightsquigarrow \cup$ 部分集合
 $S \quad L_S := \{\gamma \in L : \gamma S \cap S \neq \emptyset\}$

定義. $L \curvearrowright X$ が 固有 (proper) $\iff L_S$ はコンパクト ($\forall S: \text{コンパクト}$)
 $L \curvearrowright X$ が 自由 (free) $\iff \#L_{\{p\}} = 1 (\forall p \in X)$

“作用”の性質と“群自身”の性質を分類する

作用の性質 固有不連続な作用
作用の性質 ||
 固有な作用
 +
 群が離散位相をもつ

群作用の基礎概念の差異を与える微妙な例

$$L \curvearrowright X$$

- (A) 自由な作用 $\not\Rightarrow$ 固有な作用
- (B) すべての軌道が閉 $\not\Rightarrow L \backslash X$ はハウスドルフ

$L \subset \underset{\text{リー群}}{G} \supset H$ の設定で $X = G/H$
 $L \simeq \mathbb{R}^k$ の場合でも (A), (B) いずれにも 反例 がある.

例 4. ($G = SL(2, \mathbb{R})$) (例 3 の “連続類似”)
 $L = \mathbb{R} \curvearrowright X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ (ローレンツ計量を保つ作用)

Ex. ($G =$ 単連結な冪零リー群)
 $L = \mathbb{R}^2 \curvearrowright X = \mathbb{R}^5$ (冪零多様体)
 (吉野 2004, リップスマン予想の反例)

鍵となる問題: 不連続性の判定条件

設定
 $L \subset G \supset H$
~~離散~~ 部分群 閉部分群

基本問題
 L の G/H への作用が 固有不連続 であるかどうかを 固有
有効に 判別するための手法を見つけよ.


⊂ と ~ (定義)

$$L \subset G \supset H$$

アイデア: L と H が部分群であることを 忘れる

定義. (K-1996)

- 1) $L \triangleleft H \iff \overline{L \cap SHS}$ がコンパクト
(\forall コンパクト部分集合 $S \subset G$)
- 2) $L \sim H \iff L \subset SHS$ かつ $H \subset SLS$ となる
コンパクト部分集合 $S (\subset G)$ が存在する.



⊂ と ~ (意味)

$$L \subset G \supset H$$

G はリー群, L と H は単なる閉部分集合

- 1) $L \triangleleft H \iff$ 作用が固有であることの一般化
- 2) $L \sim H \iff$ 思考の節約

⊂ の意味: L と H が閉部分群の場合

$$L \triangleleft H \iff L \curvearrowright G/H \text{ が固有 (proper)}$$

~ は ⊂ を判別する目的において, 思考の節約になる同値関係

$$H \sim H' \iff H \triangleleft L \iff H' \triangleleft L$$

⊂ と ~ の判定条件 (簡約リー群の場合)

G : 実簡約リー群

$G = K \exp(\mathfrak{a})K$: カルタン分解

$\nu: G \rightarrow \mathfrak{a}$: カルタン射影 (Weyl 群の共役を除いて一意.)

例 6. $\nu: GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $g \mapsto \frac{1}{2}(\log \lambda_1, \dots, \log \lambda_n)$
 ここで, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n (> 0)$ は ' g ' の固有値.

$$G = GL(n, \mathbb{R})$$

$$K = O(n)$$

$$\mathfrak{a} \simeq \mathbb{R}^n$$

$$\text{ワイル群} \simeq S_n$$

⊂ と ~ の判定条件 (簡約リー群の場合)

G : 実簡約リー群

$G = K \exp(\mathfrak{a})K$: カルタン分解

$\nu: G \rightarrow \mathfrak{a}$: カルタン射影 (Weyl 群の共役を除いて一意.)

定理 A (K-1989, 1996, Benoist 1996)

- 1) $L \sim H$ in $G \iff \nu(L) \sim \nu(H)$ in \mathfrak{a} .
- 2) $L \triangleleft H$ in $G \iff \nu(L) \triangleleft \nu(H)$ in \mathfrak{a} .

右辺は「可換」な世界

特別な場合は以下を含む

(1)'s \Rightarrow : 行列の摂動における固有値の変動の 一様評価.

(2)'s \Rightarrow : 固有不連続性の判定条件.

- L, H が簡約部分群, K-'89
 \Rightarrow 応用例 $SL(2, \mathbb{R})$ の固有な作用,
 (奥田, Bocheński, Jastrzębski, Tralle)
- 定性的な判別条件 (定理 A)
 \Rightarrow 定量的な評価 (F. Kassel-K, 2016)

擬リーマン多様体の空間形—局所的に同じ“曲がり方”

(M, g) : 擬リーマン多様体,
(以下, 測地的完備と仮定する)

定義. (M, g) が 空間形
 \iff 断面曲率 κ が一定

21

リーマン多様体・ローレンツ多様体の空間形

空間形は次のパラメータを含む ($n = p + q$ は多様体の次元):

{ 擬リーマン計量 g の符号 (p, q)
{ 曲率の符号 $\kappa \in \{+, 0, -\}$

例 $q = 0$ (リーマン多様体)

球面 S^n	\mathbb{R}^n	双曲空間
$\kappa > 0$	$\kappa = 0$	$\kappa < 0$

例 $q = 1$ (ローレンツ多様体)

ド・ジッター空間	ミンコフスキー空間	反ド・ジッター空間
$\kappa > 0$	$\kappa = 0$	$\kappa < 0$

22

定曲率空間の大域的な形

擬リーマン多様体の 空間形問題

局所的性質

擬リーマン多様体の符号 (p, q) , 曲率 $\kappa \in \{+, 0, -\}$

↓

大域的性質

- コンパクト形は存在するか?
- どのような群が基本群として実現されるか?

23

擬リーマン多様体に対する空間形の大域的問題

局所的仮定

(p, q) : 擬リーマン計量の符号 ($p \geq q$), 曲率 $\kappa \in \{+, 0, -\}$

- $\kappa > 0$: Calabi–Markus 現象 (一般の場合の解決: [K-, 1989](#))
(Calabi, Markus, Wolf, Wallach, Kulkarni, K-)
- $\kappa = 0$: Auslander 予想
(Bieberbach, Auslander, Milnor, Margulis, Goldman, Abels, Soifer, ...)
- $\kappa < 0$: コンパクト形の存在問題
(Kulkarni, K-1994, Tholozan, Morita)
 $(p, q) = (2, 1), (4, 1), (6, 1), (8, 1), (10, 1), \dots,$
 $(4, 3), (8, 3), (12, 3), (16, 3), (20, 3), \dots,$
 $(8, 7)$

24

ローレンツ多様体のコンパクトな定曲率空間の存在問題

Riemannian case

Compact space forms always exist:

- $\kappa > 0$ S^n
- $\kappa = 0$ $\mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$
- $\kappa < 0$ compact hyperbolic manifolds exist

\iff Cocompact discrete subgps of $O(n, 1)$ exist

(Siegel, Borel, Makarov, Vinberg, Johnson–Millson, Gromov–Piatetski-Shapiro ...)

arithmetic	non-arithmetic
------------	----------------

Lorentzian case

Compact space forms of dimension n

- $\kappa > 0$ (de Sitter mfd) 決して存在しない (Calabi–Markus 現象)
- $\kappa = 0$ 常に存在する
- $\kappa < 0$ (anti-de Sitter mfd) 存在 $\iff n$ は奇数

擬リーマン多様体のコンパクトな定曲率空間の存在問題

- 符号 (p, q) の擬リーマン多様体に対して

定理 B 以下の条件の下で負の定曲率のコンパクト空間形が存在する

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ① q 任意, $p = 0$ | ($\iff \kappa > 0$) (\iff 球面幾何) |
| ② $q = 0, p$ 任意 | (双曲多様体) |
| ③ $q = 1, p \equiv 0 \pmod{2}$ | } (擬リーマン多様体) |
| ④ $q = 3, p \equiv 0 \pmod{4}$ | |
| ⑤ $q = 7, p = 8$ | |

Proof (1950–1994)

(①② (リーマン多様体); ③④⑤ (擬リーマン多様体) Kulkarni '81, K-'94)

予想 (K-) 定理 B は必要十分条件を与えている。

予想に関する部分的結果:

以下の場合には負曲率のコンパクトな空間形が存在しない
 $p \leq q$ (Calabi–Markus 現象 '62, 一般の場合の必要十分条件 K-'89),
 or p は奇数 (コホモロジー的障害, K-小野 '90, 森田 '17)

擬リーマン多様体のコンパクトな定曲率空間の存在問題

- 符号 (p, q) の擬リーマン多様体に対して

定理 B 以下の条件の下で負の定曲率のコンパクト空間形が存在する

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ① q 任意, $p = 0$ | ($\iff \kappa > 0$) (\iff 球面幾何) |
| ② $q = 0, p$ 任意 | (双曲多様体) |
| ③ $q = 1, p \equiv 0 \pmod{2}$ | } (擬リーマン多様体) |
| ④ $q = 3, p \equiv 0 \pmod{4}$ | |
| ⑤ $q = 7, p = 8$ | |

Proof (1950–1994)

(①② (リーマン多様体); ③④⑤ (擬リーマン多様体) Kulkarni '81, K-'94)


cf. Cartan 運動群による類似問題は完全に解決した

$$G/H = O(p, q+1)/O(p, q) \rightsquigarrow G_\theta/H_\theta$$


$$G_\theta = K \times \mathfrak{p} \quad G = K \exp(\mathfrak{p}) \text{ の Cartan 運動群}$$

Thm (K-吉野 '06) G_θ/H_θ がコンパクト Clifford–Klein 形をもつための
必要十分条件は $q < p$ の Radon–Hurwitz 数 となることである。 27

Clifford–Klein 形 $\Gamma \backslash G/H$ の構成のアイデア (定理 B の証明)



復習 $\Gamma \backslash G/H$ はハウスドルフになるとは限らない。



- H が **非コンパクト** ならば, G の $X = G/H$ への作用は固有 (proper) でない。

Step 1 X に固有に作用する L を見つける (\iff 固有性の判別条件).

Step 2 連結部分群 L の中で捻れ元のない離散部分群をとる。

Clifford–Klein 形 $\Gamma \backslash G/H$ の変形

アイディア



単射準同型 φ を動かす
 $\rightsquigarrow \varphi(\Gamma) \backslash G/H$ は $\Gamma \backslash G/H$ の変形??

- 2つの問題点
 - 非自明な変形 φ は存在するか?;
 - φ を動かしたとき、作用の固有不連続性は保たれるか?

3次元反ド・ジッター多様体の変形に関する Goldman の予想

$X_\Gamma = \Gamma \backslash X : X = G/H$ の標準的 Clifford–Klein 形

$$\dots \Gamma \subset L \overset{\sim}{\curvearrowright} G/H$$

離散部分群 固有

内部自己同型 $\text{Int}(G)$ を除いて G 内で Γ を変形する.

問題 Γ を少し変形したとき X_Γ は多様体であり続けるか?

予想 (Goldman 1985) $X = \text{AdS}^3$ のときは正しそうである.


定理 (K-, Math Ann 1998) Goldman の予想は正しい.

\rightsquigarrow 高次元の X_Γ に対する “変形理論”

$\Rightarrow \Gamma$ を曲面群 $\pi_1(\Sigma_g)$ とするとき 3次元反ド・ジッター多様体 X_Γ の非自明な変形空間は $12g - 12$ 次元となる.

局所等質空間 $\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$ (観察)

設定 $\Gamma \subset G \supset H$
 離散 リー群 閉部分群



- Γ が X に固有不連続かつ自由に作用すると仮定する。このとき、商 $\Gamma \backslash G/H = \Gamma \backslash X$ は C^∞ 多様体であり、 p_Γ は被覆写像となる。

観察 被覆写像 $p_\Gamma : X \rightarrow \Gamma \backslash X$ によって、局所等質空間 $\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$ は $X = G/H$ 上の任意の G 不変な幾何構造を受け継ぐ。

$\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$ 上のラプラシアン $\square_{\Gamma \backslash X}$

観察 被覆写像 $p_\Gamma : X \rightarrow \Gamma \backslash X$ によって、局所等質空間 $\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$ は $X = G/H$ 上の任意の G 不変な幾何構造を受け継ぐ。

- $G \supset H$ を実簡約リー群の組とする。
- \Rightarrow Killing 形式から $X = G/H$ には G 不変な擬リーマン多様体の構造が入る。
- \Rightarrow 商空間 $\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$ もこの擬リーマン構造が受け継がれる。

$\square := \text{div grad}$ (ラプラシアン)

明らかに、 $\square_X \circ p_\Gamma^* = p_\Gamma^* \circ \square_{\Gamma \backslash X}$

例 7 (反ド・ジッター多様体) $(G, H) = (O(n, 2), O(n, 1))$
 $\Rightarrow X = G/H$ はローレンツ多様体となり、ラプラシアン \square_X は双曲型作用素となる。


$\Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H$ 上のスペクトル解析

$$\begin{array}{ccc} X = G/H & \mathbb{D}_G(X) \ni D & \\ \text{被覆写像} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \Gamma \backslash X = \Gamma \backslash G/H & \mathbb{D}(\Gamma \backslash X) \ni D_\Gamma & \end{array}$$

基本問題 X 上の G 不変な微分作用素 D たちの同時固有関数 $f \in C^\infty(\Gamma \backslash X)$ (あるいは $L^2(\Gamma \backslash X)$ 等) を構成し, その同時固有値を理解したい:
 $D_\Gamma f = \lambda(D) f \quad (\forall D \in \mathbb{D}_G(X)).$
 ここで $\lambda: \mathbb{D}_G(X) \rightarrow \mathbb{C}$ は環準同型写像.

$\lambda(D): X$ 上の G 不変な微分作用素環 $\mathbb{D}_G(X) \ni D$ の同時固有値 この定式化は $\mathbb{D}_G(X)$ が可換環の場合 (たとえば, $X = G/H$ が対称空間) の場合に, より意義がある.

不定符号計量における $\Gamma \backslash G/H$ 上のスペクトル問題




特別な場合でも既に深く豊かである.

- $\Gamma = \{e\} \dots G/H$ 上の非可換調和解析
 Gelfand, Harish-Chandra, S. Helgason, Flensted-Jensen, 大島, Delorme, ...
- H コンパクト, Γ 数論的部分群 \dots 保型形式 (local theory)
 Siegel, Selberg, Piatetski-Shapiro, Langlands, Arthur, Sarnak, Müller, ...
- $G = \mathbb{R}^{p,q}$ (可換で不定値計量), $\Gamma = \mathbb{Z}^{p+q}$, $H = \{e\}$
 Oppenheim conjecture, Dani-Margulis, Ratner, Eskin, Mozes, ...

不定符号計量における $\Gamma \backslash G/H$ 上のスペクトル問題

$\Gamma \subset G \supset H$
 離散部分群 リー群 部分群



新しい試み: G が非可換かつ H が非コンパクトかつ Γ は非自明. この一般的な設定で $\Gamma \backslash G/H$ 上のスペクトル解析は?

新たに生じる困難

- (幾何) 土台となる “良い幾何” $\Gamma \backslash G/H$ は存在するか?
 リーマン幾何を越えた, 局所から大域への問題
- (解析) ラプラシアンは楕円型でなく, Weyl の法則も不成立.
- (表現論) $\Gamma \backslash G/H$ がコンパクトでも $\Gamma \backslash G$ の体積は無限となる.

反ド・ジッター多様体の “普遍的な音色”


定義 M : 反ド・ジッター多様体
 \iff 負の定曲率 ($\equiv -1$) のローレンツ多様体
def

古典的なリーマン多様体の場合では, ラプラシアン固有値 ($\neq 0$) はタイヒミュラー空間上の関数として定数ではありえない. しかし, 擬リーマン多様体では, 次の新しい現象が最近発見された:


定理 C (F. Kassel-K, Adv Math 2016)
 3次元のコンパクトな反ド・ジッター多様体のラプラシアン \square には, 可算無限個の ‘安定’ 固有値が存在する.

‘安定’ $\stackrel{\text{def}}{=} \text{反ド・ジッター多様体の変形の下で動かない}$
 反ド・ジッター多様体の (共役を除いた) 変形空間は $12g - 12$ 次元

証明の構図



定理 C の証明のスケッチ



Lemma (1) $h = \eta \circ p_! \circ q^*(g)$ is well-defined, eigenfunction of the hyperbolic Laplacian \square of AdS^3 .
 (2) (周期解の構成) M 上の超関数 g がある仮定 \star をみたらば h は Γ -軌道での和が収束し

$$h^\Gamma := \sum_{\gamma \in \Gamma} h(r \cdot) \neq 0$$

が成り立つ。

$\sim h^\Gamma$ は $M = \text{AdS}^3/\Gamma$ 上のラプラシアン \square の固有関数となる。

$\Gamma \backslash G/H$ 上のラプラシアンの L^2 固有関数の構成

$$\square f = \lambda f \text{ on } \Gamma \backslash G/H$$

- Step 1 周期のない 固有関数の構成 (積分幾何, Poisson 変換)
- Step 2 解析接続 (別の“実形”へ) (Flensted-Jensen's 双対)
- Step 3 周期解 の構成 (Poincaré 級数)
 - 幾何的評価固有な作用の幾何的評価 $\Gamma \curvearrowright G/H$ (Kazhdan–Margulis, K^- , Benoist, Kassel–K, ...)
 - 解析的評価 G/H の固有関数の解析的評価 (偏微分方程式系, 超局所解析) (佐藤–柏原–河合, 大島, ...)

References

- T. Kobayashi, [Proper action on a homogeneous space of reductive type](#), Math. Ann. 285 (1989), pp. 249–263.
- 小林俊行, 「不定値計量を持つ等質空間と不連続群」, 第 36 回幾何学シンポジウム, 東北大学, 1989, pp. 104–116.
- T. Kobayashi, [Deformation of compact Clifford–Klein forms of indefinite-Riemannian homogeneous manifolds](#), Math. Ann. 310 (1998), pp. 395–409.
- T. Kobayashi, [Discontinuous groups for non-Riemannian homogeneous spaces](#), Mathematics Unlimited—2001 and Beyond Springer-Verlag, 2001, pp. 723–747 (邦訳有)
- T. Kobayashi, [From “local” to “global”: Beyond the Riemannian geometry](#), Kavli IPMU News, 25, (2014), pp. 4–11. (邦訳有)
- T. Kobayashi, [Intrinsic sound of anti-de Sitter manifolds](#), PROMS, 191 (2016), pp. 83–99.
- F. Kassel and T. Kobayashi, [Poincaré series for non-Riemannian locally symmetric spaces](#), Adv. Math. 287, (2016), pp.123–236.
- T. Kobayashi, [Global analysis by hidden symmetry](#), Progr. Math. vol. 323, pp. 359–397, 2017.