

日本数学会

1989年度秋季総合分科会

函数解析学分科会
講演アブストラクト

1989年9月

於 上智大学

特Ⅱ. 等質ベクトル束上の調和解析と 半單純リー群のユニタリ表現

小林 俊行 東大・理

§1. (非可換) 調和解析と表現論

一般線型リー群 $GL(n, \mathbb{R})$ の(連結)な閉部分群 G は、転置に関して閉正在するとき、簡約線型リー群と呼ばれる。 $K = G \cap SO(n)$ は G の極大コンパクト部分群である。 G のリー環を \mathfrak{g} 、その複素化を \mathfrak{g}^* とかく。admissible と呼ばれるゆるやかな仮定の下で、 G のヒルベルト表現の本質的な部分は、その稠密な部分空間に定義される微分表現である (\mathfrak{g}, K) 加群におきかえられる。これは、フーリエ級数において有限三角和のみ扱う事に対応しており、表現論の代数的な研究を可能にする。既約 (resp. 既約ユニタリ) (\mathfrak{g}, K) 加群の同値類を $\text{Irr}(G)$ (resp. \widehat{G}) とかこう。

閉部分群の列 $H \subset G \subset GL(n, \mathbb{R})$ が同時に転置に関して閉正在するとき、 G/H は簡約型等質空間と呼ばれる。 H が G の半單純元の中心加群の場合や、半單純対称空間などは、その典型例である。等質空間 G/H には G 不変な測度が存在し、ヒルベルト空間 $L^2(G/H)$ への左正則表現

は G のユニタリ表現を与える。 $L^2(G/H)$ は非常に大きな空間で

$$L^2(G/H) \cong \int_{\widehat{G}}^{\oplus} m(\sigma) \sigma d\mu_{G/H}(\sigma)$$

と既約表現の直積分に一意的に展開される。 \widehat{G} 上の測度 $\mu_{G/H}$ を G/H の Plancherel 測度、 $m: \widehat{G} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ を表現の重複度と呼ぶ。点スペクトラムに相当する $\{\sigma \in \widehat{G} : \mu_{G/H}(\{\sigma\}) \neq 0\}$ は特に重要で G/H の離散系列 (discrete series) と呼ばれる。

$L^2(G/H)$ の展開には \widehat{G} の元すべてが現れるわけではない。特に群多様体の場合の $\mu_{G/H}$ の台を $\widehat{G}_{\text{temp}}$ と書こう。
($\widehat{G}_{\text{temp}}$ の元は緩増加表現といわれ、より精密な定義もある)

$$\text{Irr}(G) \supset \widehat{G} \supset \widehat{G}_{\text{temp}}$$

が定義から従い、 G がコンパクトなら 3 者は一致する。

表現論、(非可換)調和解析のそれぞれの基本問題として

1. \widehat{G} の決定 (既約ユニタリ表現の分類)
2. $L^2(G/H)$ の Plancherel の公式を明確に求める

が古くから考えられてきた。

$\text{Irr}(G)$ は、(1) Langlands, (2) Zuckerman-Vogan, (3) \mathbb{Q} -加群による、それぞれ解析、代数、幾何に比重のある分類が知られており、(1)は、 $\widehat{G}_{\text{temp}}$ の分類をみて完結した。(かく、

\widehat{G} の分類は、ランクが低い場合や $GL(n, F)$ ($F = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$) や複素古典型等解決が迫ってきてているが、現在なお、アメリカを中心とした研究が続けられている。

一方、 $L^2(G/H)$ の Plancherel の定理は、群多様体に対する Harish-Chandra が解決し、半单纯対称空間に対するのは今年大島先生が announced した。

1 と 2 は互いに影響を与えながら発展して来た。 H が非コンパクトの時、 $M_{G,H}$ の台と $\widehat{G}_{\text{temp}}$ には互いに包含関係はない、例えば半单纯対称空間の離散系列は '80 年代前半に多くの未知の既約ユニタリ表現を与えた。そのパラメータは fair (§4) に属しており、現在では Vogan の代数的结果からもユニタリ性が証明できる。

一般の簡約型等質空間に対する Plancherel の定理は、階段定理により、 H が G の極大簡約部分群の時の G/H 上のベクトル束の L^2 判斷 $L^2(G/H, \tau)$ ($\tau \in \widehat{H}$) を知る事がでれば、より精密な形で記述できる。後者の典型例として、以後 G/H は半单纯対称空間、 $\tau \in \widehat{H}$ の場合を扱う。 τ が有限次元の場合まで構成は離散系列のパラメータは上記の Vogan の条件を越える。微分幾何への応用は §3 で触れ、 τ が無限次元の時有限重複度定理が破れる事は §2 で述べる。

§2. τ が無限次元既約表現の場合

まだ殆ど研究されていないので、具体例から少しだけでも方向を見出したい。この節の内容については [K4] 参照。
 $\tau \in \widehat{A}_{\text{temp}}$, $G/H = \frac{GL(4, \mathbb{R})}{GL(2, \mathbb{R}) \times GL(2, \mathbb{R})}$ 等のいくつかの特別な場合の $L^2(G/H, \tau)$ の抽象 Plancherel formula を強引に読める事によつて次の事が観察される；

観察 1) $L^2(G/H, \tau)$ の展開において、 $\tau \in \widehat{A}$ が無限次元

ならば、 \widehat{G} の元の各重複度は無限になりうる。

2) $\tau \neq \tau'$ であつても、 $L^2(G/H, \tau)$ と $L^2(G/H, \tau')$ が
ユニタリ同値になる事がしばしば起つ。

$\tau \in \widehat{A}_{\text{temp}}$ の時、実旗多様体 G の H -開軌道の固定部分群が小さくなると (1) が起つ。 (2) は、(具体例では一層強い事が成り立つが) 少くとも次の結果がかなり一般に成立する事を期待させる：簡単のため $G = \text{Int}(g)$ とすると、
 $L^2(G/H, \tau)$ ($\tau \in \widehat{A}$) は、 \widehat{A} の「通常」パラメータに依存しない。」

§3. τ が有限次元既約表現の場合

便宜的に、次の 3 つの場合にわけて考えよう：

- 1) H はコンパクト ($= K$)。
- 2) H はコンパクト因子をもたない。
- 3) H は非コンパクトだが、コンパクト因子をもつ。

(1) は有限次元表現の問題を除いて $L^2(G)$ の場合に帰着され、(2) は前節最後に述べた観点から、いずれもユニタリ表現としては面白くない。(しかし、(1) で $L^2(G_K)$ には離散系列が存在しないのに反し、 $L^2(G_K, \tau)$ には有限個の離散系列が存在するという事実は、色々な立場からの解釈において重要である。その1つは、(1) で $\tau = 1$ の場合には知られていないタイプの離散系列の存在を示唆している事であり、もう1つは微分幾何で名大的な石川氏が提起した問題「 $\pi_1(M) = \infty$ なる開ループ多様体の普遍被覆空間上のラプラシアンは点々ベクトルを持たないだろう」(数学39-p.239) が成り立たない面白い例を与える事([SO])である。その他、[K2]に基づく無限次元表現の分歧則の一例が[K4]にある。

ユニタリ表現としては(1) が最も面白い場合であり、その離散系列(の一部)が Schlichtkrull と大島-松木 [MO] の結果を組合せる事によって構成される ([K1], [K3, p3~4])。得られた離散系列は Zuckerman の導來加群(ZDF加群; 次節参照)で表す事ができる。 L^2 -評価に必要なパラメータ $\tau \in \Lambda$ のそれがある程度独立に取るので、離散系列となる ZDF 加群のパラメーターは一層特異なものが現れる。これらは、代数的な表現論からも興味深い部分で、次節以降は特異なパラメーターを持つ ZDF 加群の立場から考察しよう。

§4 ZDF 加群

$\sqrt{-1} R_0$ の元 M を固定すると、 G における M の中心加群 L と、 M を dominant にする G の θ -stable 故物型部分代数 $\tilde{\theta} = \theta + i\mathbb{R}$ が定まる。複素多様体 G/L 上の Delbeault モロジーの代数的類似として、Zuckerman は metaplectic $(l, (L \cap K)^\sim)$ 加群から、

$$R_{q_j}^f : m(l, (L \cap K)^\sim) \rightarrow m(G, K) \quad (j \in \mathbb{Z})$$

なる誘導表現を構成した。 β, α をそれぞれ l の中心, Cartan 部分代数とする。 $Z(l)$ -無限指標 $\mu \in \alpha^*$ をもつ $W \in m(l, (L \cap K)^\sim)$ に対し、次の用語を定義する

$$(\text{weakly}) \text{ good} \iff \operatorname{Re} \langle r, \alpha \rangle \geq 0 \quad (\forall \alpha \in \Delta(U, t))$$

$$(\text{weakly}) \text{ fair} \iff \begin{cases} \operatorname{Re} \langle \gamma_j, \alpha \rangle \geq 0 & (\forall \alpha \in \Delta(U, t)) \\ [l, l] \text{ は } W \text{ に自明に作用する.} \end{cases}$$

この時、Zuckerman, Vogan より次の定理が知られている。

事実 1) W が "weakly good" なら。

$$(a) R_{q_j}^f(W) = 0 \quad (\forall j \neq S \stackrel{\text{def}}{=} \dim_{\mathbb{C}} K/(L \cap K))$$

(b) W が既約 $\Rightarrow R_{q_j}^S(W)$ は 既約 または 0.

(c) W が "ユニタリ" $\Rightarrow R_{q_j}^S(W)$ が ユニタリ化可能。

2) W が "good" なら。

$$(d) W \neq 0 \Rightarrow R_{q_j}^S(W) \neq 0$$

3) good を fair に引き入れると、(a)(c) は 正しく、(b)(d) は 不成立。

自然な子の並びによって、群の様体 (resp. 半単純対称空間) の離散系列は、good (resp. fair) なパラメータで表せる事が知られているが、前節の $L^2(G/H)$ の離散系列のパラメータは、fair でないものを含む事は特に興味深い。 $L^2(G/H, T)$ に実現されているという解析的な結果からユニタリ化可能であるというような性質が従うが、逆に $L^2(G/H, T)$ の離散系列を扱うためには、fair とは限らない ZDF 加群の研究が必要になる。前節 (ii) の典型例である $G/H = \frac{U(P, q; F)}{U(m; F) \times U(p-m, q; F)}$ ($P \geq 2m$, $F = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$) の場合に、この様な ZDF 加群のコホモロジが純次元的になる条件、すべて消えるための判定条件、既約になるための十分条件などが [K3] で調べられた。これは、代数的な手法で示され、(離散系列とは無関係の) より広い ZDF 加群にも適用できることと考えられるため、以下でそのアイデアを紹介しよう。

§5 既約性

$C_L \in M(l, (L \wr k)^*)$ が fair でない ZDF 加群 $R_q^S(C_L)$ は既約とは限らないが、半単純対称空間の離散系列に対するような特別な ZDF 加群はすべて既約である ([V2])。

D-加群の言葉で考えよう。ねじれ微分作用素への

$$d : V(g) \rightarrow R_{\lambda + p_\ell}(\ell; g) \quad (p_\ell = P(\Delta^+(\ell)))$$

なら自然な \mathbb{C} -代数準同型の像を $A_{\lambda + p_\ell}$ と書く。 C_λ が。

weakly fair なら ZDF 加群 $R_g^S(C_\lambda)$ は $R_{\lambda + p_\ell}(\ell; g)$ 加群として既約 (又は 0) となり、従って $A_{\lambda + p_\ell} = R_{\lambda + p_\ell}(\ell; g)$ は $R_g^S(C_\lambda)$ が (g, k) 加群として既約 (又は 0) となるための十分条件を与える。

$A_{\lambda + p_\ell} \neq R_{\lambda + p_\ell}(\ell; g)$ となりうる様な $g = Ap(m, \mathbb{C})$ の場合既約性の十分条件を与えてい。

$$A_{\lambda' + p_\ell} \rightarrow A_{\lambda + p_\ell}, \quad R_{g'}^S(C_{\lambda'}) \rightarrow R_g^S(C_\lambda)$$

a translation がうまくゆくなら、「 λ' での既約性 \Rightarrow λ での既約性 (又は 0)」が従うという考え方に基づいて、Vogan は二の様な (λ', λ) を見出し、[K3] によってその精緻化が与えられた。なお、二の十分条件は複素化だけで記述される。

§ 6 $R_g^S(C_\lambda) \neq 0$

$C_\lambda \in M(\ell, (L \wr K)^\sim)$ が weakly fair なら、 $R_g^S(C_\lambda)$ は $g = S$ 次を除いてすべて消滅するが、 $g = S \circ R$ で $R_g^S(C_\lambda) \neq 0$ かどうかは λ に依存する。この十分条件を得る方法として

i) Kazhdan-Lusztig 予想 … 実用上困難な事が多い。

ii) (大島 (not written); see [K1]) 対称空間の (通常の、又は ℓ)

トル束値の) 離散系列となつてゐる場合、「 $R_g^S(C_{\lambda'}) \neq 0 \Rightarrow R_g^S(C_\lambda) \neq 0$ 」

が、 G/H の無限遠で漸近挙動が消えて、いかない方向に translate できる時に保証される。この鎖が続く限り $Rg^S(C_\lambda) \neq 0$ 。

- 2) (松木・大島 (in preparation)) λ に依存する特別な小さい K-type の重複度が、一般化された Blattner の公式を用いて計算して、0 でない事が言えれば $Rg^S(C_\lambda) \neq 0$ 。
- 3) ([K3] §6) coherent continuation を使う。


そのアイデアは、パラメータ λ が十分「小さい」集合を B , fair な集合を F とすると (下図参照)

- $\{Rg^S(C_\lambda) : \lambda \in B\}$ は 1 つの開いた世界を作っている
 - $B \setminus F$ に良い情報が潜んでいる事もある
- に基づく。実際には、組み合せの問題に帰着して

$$Rg^S(C_\lambda) = 0 \ (\forall \lambda \in B) \Leftrightarrow Rg^S(C_\lambda) = 0 \ (\exists \lambda \in B \cap F)$$

を示し、左が成り立たない (F, \emptyset) を見つけるという方法である。

(模式図)



(1)(2)(3) の方法は、それぞれ広い適用範囲を持つが、今の所決定的な理解を与えていない。

逆に、 $Rg^S(C_\lambda) \neq 0$ の必要条件を得る方法として、

対称空間の離散系列となる時には松木[M]による幾何的な美しい証明が知られている。(が)I. 対称空間上の関数に実現されている事に深く依存しており、一般のZDF加群には今の所適用(難い)。 $G = U(p, q; \mathbb{F})$ の特別な場合に対しては、すべての K-type の重複度をある特別な多項式で評価するという方法が使える([K3])。fair の条件を課さなくてよいので、逆にその一般性を示唆しているとも考えられる。この手法がどの程度一般的に使えるかは今の所わかつていない。

REFERENCES

- [K1] T.Kobayashi, *Construction of discrete series for vector bundles over semisimple symmetric spaces*, RIMS Kokyuroku **642** (1988), 134-156.
- [K2] _____, *Proper action on a homogeneous space of reductive type*, Math. Ann. (1989).
- [K3] _____, *On algebraic properties of certain series of Zuckerman's derived functor modules realized as discrete series for $U(p, q; \mathbb{F})/U(p-m, q; \mathbb{F})$* , preprint (1989).
- [K4] _____ 半単純対称空間上へのベクトル束値関数に実現されるエニタリ表現、第28回実函数論・第27回函数解析学會同シンドウム報告集(1989).
- [MO] T.Matsuki and T.Oshima, *A description of discrete series for semisimple symmetric spaces*, Advanced Studies in Pure Math. **4** (1984), 331-390.
- [M] T.Matsuki, *A description of discrete series for semisimple symmetric spaces II*, Advanced Studies in Pure Math. **14** (1988), 531-540.
- [Sc] H.Schlichtkrull, *A series of unitary irreducible representations induced from a symmetric subgroup of a semisimple Lie group*, Invent.Math. **68** (1982), 497-516.
- [SOK] T.Sunada, K.Ono and T.Kobayashi, *Periodic Schrödinger operators on a manifold*, Forum Mathematicum **1-1** (1989), 69-79.
- [V1] D.Vogan, *Unitarizability of certain series of representations*, Ann.Math. (1984), 141-187.
- [V2] _____, *Irreducibility of discrete series representations for semisimple symmetric spaces*, Advanced Studies in Pure Math. **14** (1988), 191-221.