自由性と単純性：傾理論再訪

伊山 修

東京大学大学院数理科学研究科

日本数学会秋季総合分科会, 2025 年 9 月 19 日

アブストラクト <https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~iyama/MSJ2025.pdf>

はじめに

- **環**：少数の公理系を満たす加法と乗法が与えられた集合
古典的数体系の一般化
- **A-加群**：同様の公理系を満たす加法と環 A の作用が与えられた集合
ベクトル空間, アーベル群, 環のイデアルの一般化

問題

与えられた環上の加群を分類せよ

- どのような環を考えるか？
- どのような加群を考えるか？
- 何を分類と呼ぶか？

最も基本的な2つの加群のクラス：

- **自由加群**
- **単純加群**

本講演の主対象

- ① 自由加群の自然な拡張である **準傾複体**
- ② 単純加群の自然な拡張である **semibrick**

以下, 加群と言えは**右加群**を意味する

A 自身は自然に A -加群

定義

A -加群 A の集合 I 上の直和 $A^{\oplus I}$ を, **自由加群**と呼ぶ

自由加群は, あらゆる加群の中で最も大きい:

命題

任意の A -加群 X に対し, 自由 A -加群 P と全射準同型 $f : P \rightarrow X$ が存在する

圏の観点からは, 次がより自然

定義

自由加群の直和因子を, **射影加群**と呼ぶ

零加群 0 : 零元のみからなる A -加群

あらゆる加群の中で, 零加群の次に小さいものを考える :

定義

- ① A -加群 $X \neq 0$ が**単純加群**であるとは, 部分加群が 0 と X のみであること
- ② 単純加群の直和を, **半単純加群**と呼ぶ

線型代数学より :

命題

体 k 上の任意の加群は, 自由加群であり, また半単純加群でもある

証明 任意のベクトル空間は基底を持つことより, 主張が従う. □

問

体以外の環に対し, 加群を分類することは可能か?

Artin-Wedderburn の定理

環 A に対し, 以下は同値

- ① 任意の A -加群は, 半単純加群
- ② 任意の A -加群は, 射影加群
- ③ A は, Jacobson 根基が 0 の Artin 環
- ④ A は, 有限個の斜体上の行列環の直積と環同型

このとき A を **半単純環** と呼ぶ

2つ目の条件を, A の **大域次元** が 0 であるという

- **Mod A** : A -加群の圏
- **proj A** : 有限生成射影 A -加群の圏

定義

A -加群 P が **射影生成元** (progenerator) であるとは,

- ① $P \in \text{proj } A$
- ② 集合 I と全射 A -準同型 $f: P^{\oplus I} \rightarrow A$ が存在する

$\text{End}_A(X)$: A -加群 X の自己準同型環

森田の定理 (森田紀一)

環 A と B に対し, 以下は同値

- ① 圏同値 $\text{Mod } A \simeq \text{Mod } B$ が存在
 - ② A の射影生成元 P で, $\text{End}_A(P)$ が B と環同型であるものが存在
- このとき A と B は森田同値であるという

圏同値は以下で与えられる

$$\text{Hom}_A(P, -) : \text{Mod } A \simeq \text{Mod } \text{End}_A(P) : - \otimes_{\text{End}_A(P)} P$$

例

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対し, 環 A と行列環 $M_n(A)$ は森田同値

証明 自由 A -加群 $P := A^{\oplus n}$ は射影生成元であり, $\text{End}_A(P) = M_n(A)$ □

叢と道代数

2つの基本操作 **Hom** と **テンソル積** は, 環の2つの普遍的な構成法を与える

- **自己準同型環** $\text{End}_A(X)$
- 両側 A -加群 M の **テンソル代数** $T_A(M)$: 最も基本的な場合が叢の道代数

定義

箭 (えびら, quiver) とは, 4つ組 $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ で,

- ① Q_0 と Q_1 は集合
- ② s と t は写像 $Q_1 \rightarrow Q_0$ (s =source=始点, t =target=終点)

● 箭=有向グラフ

Q_0 の元を点として, また Q_1 の元 a を矢 $s(a) \xrightarrow{a} t(a)$ として描く

定義

Q を箭とする

- ① 長さ 0 の道とは, 記号 e_i のこと (ただし $i \in Q_0$)
- ② 長さ $l \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ の道とは, 矢の列 $p = a_l \cdots a_2 a_1$ で $t(a_i) = s(a_{i+1})$ ($1 \leq i < l$) を満たすもの

道 p に対し, 始点 $s(p)$ と終点 $t(p)$ が自然に定まる

環 A と叢 Q に対し、道を基底とする自由 A -加群を AQ と表す

定義

以下で定まる積を A -線型に拡張して、道代数 AQ を定める

- 道 p, q が $t(p) = s(q)$ を満たすときは、これらを繋げた道を qp とする
($p = e_i$ なら $qp := q$ とし, $q = e_i$ なら $qp := p$)
- 道 p, q が $t(p) \neq s(q)$ を満たすときは, $qp := 0$ とする

- 例 (1) の Q に対し, $AQ \simeq T_n(A) := \begin{bmatrix} A & A & \cdots & A & A \\ 0 & A & \cdots & A & A \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A & A \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A \end{bmatrix}$
- 例 (2) の Q に対し, $AQ \simeq A\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ (n 変数非可換多項式環)
- 道代数 AQ をイデアルで割ることが, 環の標準的な構成法
例えば $A[x_1, \dots, x_n] = A\langle x_1, \dots, x_n \rangle / (x_i x_j - x_j x_i \mid 1 \leq i, j \leq n)$

命題

体 k と叢 Q に対し, 道代数 kQ の大域次元は 1 以下 (遺伝的)

証明 kQ は, テンソル代数 $T_{kQ_0}(kQ_1)$ と同型であることを使う □

- 環 A 上の A -加群 $X \neq 0$ に対し,
 X : **直既約** $\iff X$ が A -加群の直和 $Y \oplus Z$ と同型なら, Y と Z のどちらかが 0

Gabriel の定理

k を体とする. 簾 Q に対し, 以下は同値

- kQ は**有限表現型**, つまり直既約加群の同型類は有限個
- Q は **Dynkin 型** の簾の非交和

Dynkin 型 の簾 = 以下のグラフの辺を矢に置き換えて得られる簾

Dynkin 型の簾 Q に対し

$\{ \text{直既約 } kQ\text{-加群の同型類} \} \simeq \Phi^+ : Q \text{ のルート系の正ルート}$

A_n 型の箭 $Q = [1 \leftarrow 2 \leftarrow \dots \leftarrow n-1 \leftarrow n]$

$$\text{道代数 } kQ = T_n(k) = \begin{bmatrix} k & k & \dots & k & k \\ 0 & k & \dots & k & k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & k & k \\ 0 & 0 & \dots & 0 & k \end{bmatrix}$$

- 直既約射影 kQ -加群の同型類の全体は, $T_n(k)$ の n 個の行ベクトル

$$P_1 := [kk \dots kk] \supset P_2 := [0k \dots kk] \supset \dots \supset P_n := [00 \dots 0k]$$

- 直既約 kQ -加群の同型類の全体は以下 ($P_{n+1} := 0$)

$$\{X_{i,j} := P_i/P_{j+1} = [0 \dots 0 \overset{1}{k} \dots \overset{j}{k} 0 \dots 0] \mid 1 \leq i \leq j \leq n\} \simeq \Phi_+$$

- 環 A に対し, $\text{mod } A$ で長さが有限な A -加群の圏を表す
- $\text{mod } kQ$ の構造は **Auslander-Reiten 箭** で完全に記述される

点: 直既約 kQ -加群の同型類

矢: 既約写像 $f: X \rightarrow Y$

- 拡大 Dynkin 型の籐の場合も, $\text{mod } kQ$ は十分に良く分かる
- 一般の籐でも, 直既約加群の次元ベクトルは正ルートと一致 (Kac の定理)
しかし対応は一对一ではなく, 同型類の分類は hopeless (wild 表現型)
- 対応策: 特定の加群に着目して分類を行う

brick と semibrick

以下, $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする

定義

- ① $\mathcal{A}$ の対象 $X \neq 0$ が **brick** であるとは, 任意の射 $X \rightarrow X$ が 0 または同型であること ($\Leftrightarrow \text{End}_{\mathcal{A}}(X)$ が斜体)
- ② $\mathcal{A}$ の brick の集合 S が **semibrick** であるとは, S の異なる元の間射は 0 に限ること

Schur の補題

- ① $\mathcal{A}$ の単純対象は, brick である
- ② $\mathcal{A}$ の非同型な単純対象からなる集合は, semibrick である

単純 $\implies$ brick $\implies$ 直既約だが, 逆は不成立

定義

$\mathcal{A}$ の充満部分圏 $\mathcal{B}$ が核, 余核, 拡大で閉じるとき, **wide 部分圏** と呼ぶ

- アーベル圏 $\mathcal{A}$ の wide 部分圏 $\mathcal{B}$ もまた, アーベル圏
- $\text{sim } \mathcal{B}$: $\mathcal{B}$ の単純対象の同型類の全体

Ringel の補題

$\mathcal{A}$ の任意の semibrick $\mathcal{S}$ に対し, $\mathcal{A}$ の wide 部分圏 $\mathcal{B}$ が存在し, $\mathcal{S} = \text{sim } \mathcal{B}$ が成立する. この $\mathcal{B}$ は, 以下で与えられる

$$\mathcal{B} = \text{Filt } \mathcal{S} := \{X \in \mathcal{A} \mid \exists X = X_0 \supset X_1 \supset \cdots \supset X_n = 0 \text{ s.t. } X_i/X_{i+1} \in \mathcal{S}\}$$

- $\text{sbrick } \mathcal{A}$: $\mathcal{A}$ の semibrick の同型類の全体
- $\text{wide } \mathcal{A}$: $\mathcal{A}$ の wide 部分圏の全体
- 環 A に対し $\text{sbrick } A := \text{sbrick}(\text{mod } A)$, $\text{wide } A := \text{wide}(\text{mod } A)$

以上をまとめて次を得る

命題

アーベル圏 $\mathcal{A}$ の任意の対象の長さが有限なら, 以下は全単射:

$$\text{sim} : \text{wide } \mathcal{A} \simeq \text{sbrick } \mathcal{A} : \text{Filt}$$

- Dynkin 型の簾 Q の道代数 kQ 上の加群に対し, $\text{brick} \iff \text{直既約}$

Q	A_n	D_n	E_6	E_7	E_8
# sbrick kQ	$\frac{1}{n+2} \binom{2n+2}{n+1}$	$\frac{3n-2}{n} \binom{2n-2}{n-1}$	833	4160	25080

- A_2 型の Auslander-Reiten 簾 $[0k]$ $\begin{matrix} \nearrow [kk] \\ \searrow [k0] \end{matrix}$ を $\boxed{\begin{matrix} \circ & \circ & \circ \end{matrix}}$ と表す
sbrick $A \simeq \text{wide } A$ は右の 5 個
semibrick の元を $\bullet$ で表し,
それ以外の wide 部分圏の直既約対象を $*$ で表す

- A_3 型の Auslander-Reiten 簾 $[00k]$ $\begin{matrix} \nearrow [kkk] \\ \searrow [kk0] \\ \nearrow [0kk] \\ \searrow [k0k] \end{matrix}$ を $\boxed{\begin{matrix} \circ & \circ & \circ & \circ \end{matrix}}$ と表す
sbrick $A \simeq \text{wide } A$ は下の 14 個

- Kronecker 箭 $[1 \leq n \leq 2]$ の無限体上の道代数は, 無限個位数の semibrick を持つ. 導来圏同値を介して, $\mathbb{P}^1$ の摩天楼層に対応する

導来圏と傾理論

以下, $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする

- $\mathcal{A}$ 上の複体 : $X = \left[\dots \xrightarrow{d_X^{-2}} X^{-1} \xrightarrow{d_X^{-1}} X^0 \xrightarrow{d_X^0} X^1 \xrightarrow{d_X^1} \dots \right]$
 s.t. $\forall i \in \mathbb{Z}, X^i \in \mathcal{A}, d_X^i \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^i, X^{i+1}), d_X^{i+1} \circ d_X^i = 0$

定義 (Grothendieck, Verdier)

導来圏 $D(\mathcal{A})$ を以下で定める

① 対象 : $\mathcal{A}$ 上の複体

- 鎖準同型 :
$$\begin{array}{ccccccccccc} X : \dots & \xrightarrow{d_X^{-2}} & X^{-1} & \xrightarrow{d_X^{-1}} & X^0 & \xrightarrow{d_X^0} & X^1 & \xrightarrow{d_X^1} & \dots \\ \downarrow f & & \downarrow f^{-1} & & \downarrow f^0 & & \downarrow f^1 & & \\ Y : \dots & \xrightarrow{d_Y^{-2}} & Y^{-1} & \xrightarrow{d_Y^{-1}} & Y^0 & \xrightarrow{d_Y^0} & Y^1 & \xrightarrow{d_Y^1} & \dots \end{array}$$

 s.t. $\forall i \in \mathbb{Z}, f^i \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^i, Y^i), f^{i+1} \circ d_X^i = d_Y^i \circ f^i$

- $f : X \rightarrow Y$ が擬同型 $\iff \forall i \in \mathbb{Z}, H^i(f) : H^i(X) \rightarrow H^i(Y)$ が同型

② 射 : 鎖準同型に, 擬同型の逆射を加えたもの

- 複体 $X = (X^i, d_X^i)$ が有界 $\iff$ 有限個の $i \in \mathbb{Z}$ を除いて $X^i = 0$
- $D^b(\mathcal{A}) := \{X \in D(\mathcal{A}) \mid X \text{ は有界複体}\}$

Dynkin 型の圏 Q に対し, $D^b(\text{mod } kQ)$ の構造は十分に良く分かる (Happel)

- $\text{mod } kQ$ の Auslander-Reiten 圏をシフトしたものを貼り合わせて, $D^b(\text{mod } kQ)$ の Auslander-Reiten 圏が得られる
- A_2 型の圏 Q に対し, $D^b(\text{mod } kQ)$ の Auslander-Reiten 圏は

- A_3 型の圏 Q に対し, $D^b(\text{mod } kQ)$ の Auslander-Reiten 圏は

- $i \in \mathbb{Z}$ に対し, 複体を i 個左にずらす **シフト関手** $[i] : D(A) \simeq D(A)$
- $K^b(\text{proj } A)$: $\text{proj } A$ 上の有界複体のホモトピー圏
これは $D(A) := D(\text{Mod } A)$ の充満部分圏と見なされる

定義 (Brenner-Butler, 宮下, Rickard)

$T \in D(A)$ が以下を満たすとき, **傾複体** (tilting complex) と呼ぶ

- ① $T \in K^b(\text{proj } A)$ かつ, $\forall i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \text{Hom}_{D(A)}(T, T[i]) = 0$
 - ② T は $K^b(\text{proj } A)$ を **生成する**
- $A = [\cdots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow \cdots]$ や, そのシフト $A[i]$ は傾複体
 - 箴の道代数に対する **鏡映関手** は, 特定の傾加群で与えられる
- 次は, 森田の定理の導来圏版

Rickard の定理

環 A, B に対し, 以下は同値

- ① 三角圏の同値 $D(A) \simeq D(B)$ が存在
- ② A の傾複体 T で, $\text{End}_{D(A)}(T)$ が B と環同型であるものが存在

定義 (Keller-Vossieck, 相原-I)

$T \in D(A)$ が以下を満たすとき, **前準傾複体** (presilting complex)

- ① $T \in K^b(\text{proj } A)$ であり, $\forall i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \text{Hom}_{D(A)}(T, T[i]) = 0$
さらに以下を満たすとき, **準傾複体** (silting complex) と呼ぶ
- ② T は $K^b(\text{proj } A)$ を**生成する**

注意

準傾複体は, **dg 代数** A の導来圏 $D(A)$ でも同様に定義される
 A が準傾複体 $\iff A$ は **connective** (つまり $\forall i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, H^i(A) = 0$)

- 以下, A は体 k 上の有限次元代数とする

命題 (Krull-Schmidt の定理の特別な場合)

任意の $X \in K^b(\text{proj } A)$ は, 直既約複体の直和 $X = X_1 \oplus \cdots \oplus X_m$ として一意的に表される

- このとき, X が**基本的** $\iff X_1, \dots, X_m$ は互いに非同型
- **silt A** : 基本的な準傾複体の同型類全体

定義

$\text{proj } A$ の直既約対象の同型類の全体を $P_1, \dots, P_n$ とする

- ① A の **ランク** を n と定める
- ② $\text{proj } A$ の **Grothendieck 群** とは

$$K_0(\text{proj } A) := \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}[P_i] \quad (\text{自由アーベル群})$$

三角圏 $K^b(\text{proj } A)$ の Grothendieck 群を, $K_0(\text{proj } A)$ と同一視する

命題 (相原-I)

任意の $T \in \text{silt } A$ を $T = T_1 \oplus \dots \oplus T_m$ (各 T_i は直既約) と表すとき, $[T_1], \dots, [T_m]$ は $K_0(\text{proj } A)$ の基底. 特に $m = n$

傾理論 (tilting theory) の名称の由来

傾複体 / 準傾複体を選ぶ $\implies$ Grothendieck 群の基底変換 $\implies$ 座標軸が**傾く**

命題 (相原-I)

silt A は以下で定まる半順序を持つ

$$T \geq U \iff \forall i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \text{Hom}_{D(A)}(T, U[i]) = 0$$

定義

半順序集合 $(P, \geq)$ のハッセ図を, 以下で定める

- ① 点は, P の元
 - ② 矢 $x \leftarrow y$ を描く $\iff x > y$ かつ, $\nexists z \in P$ s.t. $x > z > y$
- A のランクが 1 なら, $\text{silt } A = \{A[i] \mid i \in \mathbb{Z}\}$
ハッセ図は $\dots \longleftarrow A[-1] \longleftarrow A \longleftarrow A[1] \longleftarrow A[2] \longleftarrow \dots$

- A_2 型の簇 Q に対し, $D^b(\text{mod } kQ)$ の直既約複体を以下で表す

$\text{silt } kQ$ のハッセ図は

変異 : 与えられた準傾対象の直和因子を取り替えて, 新しい準傾対象を得る操作

定義

$\mathcal{A}$ を加法圏, $\mathcal{B}$ をその充満部分圏とする

- ① 射 $f : Y \rightarrow X$ が $X \in \mathcal{A}$ の **右 $\mathcal{B}$ -近似** であるとは, $Y \in \mathcal{B}$ かつ,
 $\forall Z \in \mathcal{B}, \forall g : Z \rightarrow X, \exists h : Z \rightarrow Y$ s.t. $g = f \circ h$

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ \swarrow \exists h \text{ (dotted)} & \downarrow \forall g & \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

- ② 射 $f : Y \rightarrow X$ が **右極小** であるとは, $f \circ g = f$ を満たす射 $g : Y \rightarrow Y$ は同型射に限ること

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ g \downarrow & \searrow & \nearrow \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

- ③ 双対的に **左 $\mathcal{B}$ -近似** と **左極小** を定義する

- $X \in K^b(\text{proj } A)$ から充満部分圏を定める

$$\text{add}X := \{X^{\oplus \ell} \text{ の直和因子 } (\ell \in \mathbb{N})\} \subset K^b(\text{proj } A)$$

- 鎖準同型 $f : Y \rightarrow X$ の写像錐を $\text{cone } f \in K^b(\text{proj } A)$ と表す

定理 (相原-I)

任意の $T \in \text{silt } A$ を $T = T_1 \oplus \cdots \oplus T_n$ (各 T_i は直既約) と表す
各 $1 \leq i \leq n$ に対し, 以下が成立

- ① 右極小な右 $\text{add}(T/T_i)$ -近似 $f_i : Y_i \rightarrow T_i$ が存在し,

$$\mu_i^+(T) := (T/T_i) \oplus (\text{cone } f_i)[-1] \in \text{silt } A$$

- ② 左極小な左 $\text{add}(T/T_i)$ -近似 $g_i : T_i \rightarrow Z_i$ が存在し,

$$\mu_i^-(T) := (T/T_i) \oplus (\text{cone } g_i) \in \text{silt } A$$

$\mu_i^+(T), \mu_i^-(T)$ を T の変異と呼ぶ

- ③ $\mu_i^- \circ \mu_i^+(T) = T = \mu_i^+ \circ \mu_i^-(T)$

- ④ $\text{silt } A$ のハッセ図は, 以下の矢を持つ

$$\mu_i^+(T) \leftarrow T \leftarrow \mu_i^-(T) \quad (1 \leq i \leq n)$$

- ⑤ $\text{silt } A$ のハッセ図で, T を端点とする矢は, これら $2n$ 本に限る

2 項準傾複体

2項準傾複体

以下, A を体 k 上の有限次元代数とする.

- 2項複体の成す $K^b(\text{proj } A)$ の充満部分圏を考える:

$$K^{[-1,0]}(\text{proj } A) := \left\{ X = [\cdots \rightarrow 0 \rightarrow X^{-1} \xrightarrow{d_X^{-1}} X^0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots] \right\}$$

- 0次コホモロジーをとることで, 忠実充満関手を得る

$$H^0 : K^{[-1,0]}(\text{proj } A) \simeq \text{mod } A$$

- $K^{[-1,0]}(\text{proj } A)$ に属する (前) 準傾複体を 2項 (前) 準傾複体と呼ぶ

$$2\text{-silt } A := \text{silt } A \cap K^{[-1,0]}(\text{proj } A) = \{ T \in \text{silt } A \mid A \geq T \geq A[1] \}$$

定理 (足立-I-Reiten, Demonet-I-Jasso, Derksen-Fei)

- ① 2項前準傾複体 T の同型類は, $[T] \in K_0(\text{proj } A)$ によって決定される
 - ② 任意の2項前準傾複体は, ある2項準傾複体の直和因子である
- 任意の $T \in 2\text{-silt } A$ を $T = T_1 \oplus \cdots \oplus T_n$ (各 T_i は直既約) と表す
- ③ 各 $1 \leq i \leq n$ に対し, $\mu_i^+(T)$ と $\mu_i^-(T)$ のうち, ただ1つが $2\text{-silt } A$ に属する
 - ④ $2\text{-silt } A$ のハッセ図は, T を端点とする矢を丁度 n 本持つ

- A のランクが 1 なら, 2-silt A は赤

$$\dots \longleftarrow A[-1] \longleftarrow A \longleftarrow A[1] \longleftarrow A[2] \longleftarrow \dots$$

- A_2 型の簇 Q に対し, 2-silt kQ は赤

定義

A をアーベル圏, B をその充満部分圏とする

- ① B が商対象と拡大で閉じるとき, **ねじれ類** (torsion class) と呼ぶ
- ② B が部分対象と拡大で閉じるとき, **ねじれ自由類** (torsionfree class) と呼ぶ
- ③ A の任意の対象が右 B -近似を持つとき, B を**反変有限**と呼ぶ
- ④ A の任意の対象が左 B -近似を持つとき, B を**共変有限**と呼ぶ

$\text{mod } A$ のねじれ類は常に反変有限, ねじれ自由類は常に共変有限

定理 (足立-I-Reiten)

以下の対象の間に標準的な全単射が存在する

- ① 2-silt A
- ② $\text{mod } A$ の共変有限なねじれ類

$$T \mapsto \{H^0(T)^{\oplus \ell} \text{ の商加群 } (\ell \in \mathbb{N})\}.$$

- ③ $\text{mod } A$ の反変有限なねじれ自由類

$$T \mapsto H^0(T)^\perp.$$

- $\text{mod } A$ の対象の集合 S に対し, S を含む最小のねじれ類を $T(S)$ と表す
 $T(S)$ が共変有限なときに, S を左有限と呼ぶ
- $X \in \text{mod } A$ に対し, $\text{ind}X := \{X \text{ の直既約直和因子の同型類} \}$

定理の続き (浅井, Ingalls-Thomas, Marks-Stovicek)

- ④ A の左有限な semibrick

$$T \mapsto \mathcal{S}_T := \text{ind}(H^0(T) / \text{rad}_{\text{End}_{D(A)}(T)} H^0(T))$$

- ⑤ $\text{mod } A$ の左有限な wide 部分圏 $\mathcal{B}$

$$T \mapsto \text{Filt } \mathcal{S}_T$$

S. Asai, *Semibricks*, Int. Math. Res. Not. IMRN 2020, Issue 16, 4993–5054.

他の対応物 (... , Brüstle-Yang, König-Yang)

- ⑥ 台 τ 傾加群 (support τ -tilting module) ($\iff T \in 2\text{-silt } A \text{ の } H^0(T)$)
- ⑦ 右有限な semibrick, 右有限な wide 部分圏
- ⑧ 中間的な co-t-structure, t-structure, simple-minded collection
- ⑨ (特定の状況で) 団傾対象 (cluster tilting object)

- **tors A** : mod A のねじれ類の全体
- 以下の単射を得る

$$2\text{-silt } A \hookrightarrow \text{sbrick } A \xrightarrow[\sim]{\text{Filt}} \text{wide } A \xrightarrow{\text{T}} \text{tors } A \quad (1)$$

定理 (Demonet-I-Jasso)

(1) のいずれか 1 つの集合が有限集合ならば, (1) は全て全単射となる
特に (1) は全て, 有限集合となる

このとき A を **g 有限** と呼ぶ

- 有限表現型 $\implies$ g 有限, またランク 1 $\implies$ g 有限
- Dynkin 型の簾 Q の **前射影代数** Π は g 有限 (水野, Buan-I-Reiten-Scott)
Q の Weyl 群 W に対し, 以下の半順序集合の同型が存在
 $(W, \text{弱順序}) \simeq 2\text{-silt } \Pi$
- Dynkin 型の簾 Q の道代数 kQ も g 有限
2-silt kQ と Q の団代数の団が **一対一** に対応する (団代数の圏化)
2-silt kQ は, W から定まる **Cambrian 束** と同型

$H^0(T)$ の直既約直和因子を ● で表し,
 それ以外のねじれ類の直既約対象を * で表す
 各矢は準傾対応による brick ラベル (浅井)

g 扇

g 扇 (g-fan)

A : 体 k 上の有限次元代数

- $P_1, \dots, P_n$: $\text{proj } A$ の直既約対象の同型類の全体
- $K_0(\text{proj } A)_{\mathbb{R}} := K_0(\text{proj } A) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} = \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{R}[P_i]$: 実 Grothendieck 群

定義 (青木-東谷-I-加瀬-水野)

A の 2 項前準傾複体 T を直既約複体の直和 $T = T_1 \oplus \dots \oplus T_m$ として表す

$$C(T) := \text{cone}\{[T_1], \dots, [T_m]\} \subset K_0(\text{proj } A)_{\mathbb{R}}$$

$$\Sigma(A) := \{C(T) \mid T \text{ は } A \text{ の 2 項前準傾複体}\} : A \text{ の } g \text{ 扇 (g-fan)}$$

- A_2 型と A_3 型の簇 Q に対し, $\Sigma(kQ)$ は以下

- サイクルを持たない簇 Q に対し, $\Sigma(kQ)$ は団代数の g ベクトルから定まる扇
- Dynkin 型の簇 Q の前射影代数 Π に対し, $\Sigma(\Pi)$ は Coxeter 扇
- 一般の簇でも $\Sigma(\Pi)$ は Coxeter 扇を含む
cDV 特異点の非可換クレパント特異点解消に応用 (I-Wemyss)

系 (青木-東谷-I加瀬-水野)

A のランクを n とすると, $\Sigma(A)$ は以下を満たす

- ① 非特異な扇である
- ② 任意の錐は, ある n 次元の錐の面である
- ③ 任意の $(n-1)$ 次元の錐は, 丁度2つの n 次元の錐の面である
- ④ 正錐 $C(A) = \text{cone}\{[P_1], \dots, [P_n]\}$ と負錐 $-C(A)$ は, $\Sigma(A)$ に属する
- ⑤ 任意の錐は, 基底 $[P_1], \dots, [P_n]$ に関する 2^n 個の象限のいずれかに含まれる

以上の性質を満たす扇を**符号同一**と呼ぶ

定理 (Demonet-I-Jasso, 浅井, 青木-東谷-I加瀬-水野, Fei)

- ① $\Sigma(A)$ は, 2-silt A のハッセ図を決定する
- ② A が g 有限 $\iff \Sigma(A)$ が有限 $\iff \Sigma(A)$ が完備

A が g 有限であると仮定し, その h ベクトルを $(h_0, \dots, h_n)$ とする

- ③ $\Sigma(A)$ はある格子多面体の normal fan となる
- ④
$$h_i = \#\{S \in \text{sbrick } A \mid \#S = i\}$$
$$= \#\{T \in \text{2-silt } A \mid T \text{ はハッセ図の丁度 } i \text{ 本の矢の終点となる}\}$$
- ⑤ $h_i = h_{n-i}$ (Dehn-Sommerville 等式)
- ⑥ $h_1 \leq h_2 \leq \dots \leq h_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}, h_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \geq \dots \geq h_{n-1} \geq h_n$ (単峰性)

問題

g 扇として実現される有限扇を特徴付けよ。

ランク 2 では、符号同一性が必要十分条件を与える

定理 (青木-東谷-I-加瀬-水野)

$\mathbb{R}^2$ 内の任意の符号同一な有限扇 Σ に対し、 k 上の有限次元代数 A が存在して、 $\Sigma(A) = \Sigma$ が成立

ランク 3 以上では、上の問題は難しいため、次の特別なクラスに着目する

定義

$T \in 2\text{-silt } A$ を直既約複体の直和 $T = T_1 \oplus \cdots \oplus T_n$ として表し、

$$C_{\leq 1}(T) := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i [T_i] \mid a_i \geq 0, \sum_{i=1}^n a_i \leq 1 \right\} \subset K_0(\text{proj } A)_{\mathbb{R}},$$

$$P(A) := \bigcup_{T \in 2\text{-silt } A} C_{\leq 1}(T)$$

$P(A)$ が凸ならば、 $P(A)$ を g 多面体と呼び、 A と $\Sigma(A)$ を g 凸と呼ぶ

命題 (青木-東谷-I加瀬-水野)

A が g 凸ならば, $P(A)$ は反射多面体である. 特に, ランク n の g 凸な g 扇は, 有限個しか存在しない

問題

g 多面体として実現される反射多面体を特徴付けよ

ランクが 2 と 3 の場合は, 以下の解答が与えられている

定理 (青木-東谷-I加瀬-水野)

- ① ランク 2 の g 多面体は, 同型を除いて以下の 7 種類である

- ② ランク 3 の g 多面体は, 同型を除いて以下の 61 種類である