双曲結び目の補空間の無限巡回被覆の 3D index について

大槻 知忠¹ (京大 数理研)

Dedicated to Professor Yukio Matsumoto on the occasion of his 80th birthday

この原稿は著者の論文 [5] の解説原稿である。以下の内容について詳しくは [5, 6] を参照されたい。

カスプ付き 3 次元多様体 M に対して、3D index $I(M) \in \mathbb{Z}[[q]]$ が、Dimofte-Gaiotto-Gukov [1] により、導入されて、 M の位相不変量であることが予言された。 $\mathcal{T}$ を M の理想 4 面体分割とする。 $\mathcal{T}$ の辺の整数ラベルに関する状態和を用いることによって変数 q の整数係数べき級数として M の 3D index が数学的に定式化される。この状態和は無有限和であって、収束するとは限らないが、 $\mathcal{T}$ が「狭義角構造」をもつとき、この無限和は収束する。その典型的な場合は「 $\mathcal{T}$ がカスプ付き 3 次元双曲多様体の理想 4 面体分割であるとき」である。すなわち、3D index $I(M)$ は、カスプ付き 3 次元双曲多様体 M に対して定義されるが、すべてのカスプ付き 3 次元多様体 M に対して定義されるわけではない。また、 $I(M)$ が位相不変量であることは [2] で示されている。

双曲結び目 K に対して、その補空間 $S^3 - K$ はカスプ付き 3 次元双曲多様体であり、その 3D index が定義される。さらに、 $M_n(K)$ を $S^3 - K$ の n 重巡回被覆空間とすると、これもカスプ付きの 3 次元双曲多様体になり、その 3D index $I(M_n(K))$ が定義される。 $I(M_n(K))$ の値の漸近挙動について考察することが、この原稿の目標である。標語的に言うと“ $S^3 - K$ の無限巡回被覆の「同変 3D index」を定式化したい”ということ念頭においている。

この話題の数理物理的背景について、3D index は数理物理的には $SL(2, \mathbb{C})$ Chern-Simons 理論の相関関数とみなされる ([1] 参照)。その $SL(2, \mathbb{C})$ Chern-Simons 汎関数の臨界点は、 $SL(2, \mathbb{C})$ 平坦接続、すなわち $\pi_1(M)$ の $SL(2, \mathbb{C})$ 表現であり、双曲構造に対応するホロノミー表現における、その相関関数の摂動展開は、「3D index の体積予想」を与えることが期待されている ([3, 4] 参照)。 $I(M_n(K))$ の値の漸近挙動が、その問題に関連することを期待している。

この原稿は次のように構成される。第 1 節で、3D index の定義と、定義の無限和が収束することを、復習する。第 2 節で、 $I(M_n(K))$ の値の d 次の係数は十分大きい n に対して n の $2d$ 次多項式になることを述べる。第 3 節で、遷移行列をつかった $I(M_n(K))$ の値の表示について述べる。

¹The author is partially supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP21H04428 and JP19K21830.

1 3D index の定義

この節では、3D index の定義と、定義式の和が収束することを、復習する。詳しくは [5, 6] を参照されたい。

整数 m, e に対して、

$$\tilde{I}(m, e) = \sum_{n=\max\{0, -e\}}^{\infty} (-1)^n \frac{q^{\frac{1}{2}n(n+1) - (n+\frac{1}{2}e)m}}{(q)_n (q)_{n+e}}$$

とおく、ここで、

$$(q)_n = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0, \\ (1-q)(1-q^2)\cdots(1-q^n) & \text{if } n > 0 \end{cases}$$

である。整数 l_1, l_2, l_3 に対して、

$$\begin{aligned} I(l_1, l_2, l_3) &= (-q^{1/2})^{-l_1} \tilde{I}(l_1 - l_2, l_3 - l_1) \\ &= (-q^{1/2})^{-l_2} \tilde{I}(l_2 - l_3, l_1 - l_2) \\ &= (-q^{1/2})^{-l_3} \tilde{I}(l_3 - l_1, l_2 - l_3) \end{aligned}$$

とおく (右辺の 3 式の値が等しいことは非自明であり、 $\tilde{I}(m, e)$ がみたす関係式からそれらが等しいことが導かれる)。 $I(l_1, l_2, l_3)$ の値は l_1, l_2, l_3 の置換に関して不変であり、

$$I(l_1, l_2, l_3) = (-q^{1/2})^{-c} I(l_1 + c, l_2 + c, l_3 + c) \quad (1)$$

をみたすことに注意する。

M をカスプを 1 つもつ 3 次元双曲多様体とする。双曲結び目の補空間がその典型的な例である。 M はその双曲構造を与えるような理想 4 面体分割 $\mathcal{T}$ をもつと仮定する²。 $\mathcal{T}$ は m' 個の 4 面体と m 本の辺をもつとする (カスプの近傍の境界のトーラスのオイラー数を計算することにより、 $m = m'$ であることがわかる)。4 面体の集合と辺の集合のそれぞれに順序をいれて、 i 番目の 4 面体を Δ_i とかくことにして、 j 番目の辺を $\mathcal{E}_j$ とかくことにする。各 4 面体の対辺に同じラベルがつくように、辺 $\mathcal{E}_j$ に整数ラベル a_j をつける。4 面体 Δ_i には次の図のようにラベルがつけられている。

²この仮定は、以下の記述を簡単にするための仮定であり、この仮定がなくても以下の内容は成立する。実際、カスプ付き 3 次元双曲多様体は標準分割 (理想多面体分割) をもち、退化した理想 4 面体 (2 次元につぶれた理想 4 面体) を許せば、標準分割をさらに分割して (退化した) 理想 4 面体分割にできる。そして、以下の内容は、退化した理想 4 面体 (面角が 0 や π である場合) を用いた理想 4 面体分割に対して、成立する。

ここで、 f, f', g, g', h, h' は写像 $\{1, \dots, m'\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$ であり、 $\mathcal{E}_{f(i)}$ と $\mathcal{E}_{f'(i)}$ 、 $\mathcal{E}_{g(i)}$ と $\mathcal{E}_{g'(i)}$ 、 $\mathcal{E}_{h(i)}$ と $\mathcal{E}_{h'(i)}$ が Δ_i の対辺であるようなものである。 M の 3D index を、任意の j を固定して、

$$I(M) = \sum_{\substack{a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z} \\ a_j=0}} q^{a_1 + \dots + a_m} \prod_i I(a_{f(i)} + a_{f'(i)}, a_{g(i)} + a_{g'(i)}, a_{h(i)} + a_{h'(i)}) \in \mathbb{Z}[[q]] \quad (2)$$

で定める。右辺の和の値が、固定した j の選び方によらないことは、 $(a_1, \dots, a_m)$ を $(a_1 + c, \dots, a_m + c)$ で取り替えることに関して、「和をとられる部分」の値が不変であることから導かれる。

3D index の定義式 (2) の右辺の和が収束すること

$I(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ の最低次数を $I(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ の次数であると定める。 $I(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ の定義より、

$$\deg I(\ell_1, \ell_2, \ell_3) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ell_2 - \ell_1)(\ell_3 - \ell_1) - \frac{1}{2}\ell_1 & \text{if } \ell_1 \leq \ell_2 \text{ and } \ell_1 \leq \ell_3, \\ \frac{1}{2}(\ell_1 - \ell_2)(\ell_3 - \ell_2) - \frac{1}{2}\ell_2 & \text{if } \ell_2 \leq \ell_1 \text{ and } \ell_2 \leq \ell_3, \\ \frac{1}{2}(\ell_1 - \ell_3)(\ell_2 - \ell_3) - \frac{1}{2}\ell_3 & \text{if } \ell_3 \leq \ell_1 \text{ and } \ell_3 \leq \ell_2 \end{cases} \quad (3)$$

であることがわかる。多くの場合、 $I(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ の次数は正であるが、負になる場合もあることに注意する。

理想 4 面体 Δ_i の面角を次の図のように $2\pi\alpha_i, 2\pi\beta_i, 2\pi\gamma_i$ とおく。

図で $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ とかいているところの面角が $2\pi\alpha_i, 2\pi\beta_i, 2\pi\gamma_i$ である。このとき、

$$\alpha_i + \beta_i + \gamma_i = \frac{1}{2} \quad (4)$$

が成り立つ。辺 $\mathcal{E}_j$ のまわりの面角の和が 2π であることより、各 j について

$$\sum_{f(i)=j} \alpha_i + \sum_{f'(i)=j} \alpha_i + \sum_{g(i)=j} \beta_i + \sum_{g'(i)=j} \beta_i + \sum_{h(i)=j} \gamma_i + \sum_{h'(i)=j} \gamma_i = 1$$

であることがわかる。よって、

$$\begin{aligned} & \sum_i \alpha_i(a_{f(i)} + a_{f'(i)}) + \beta_i(a_{g(i)} + a_{g'(i)}) + \gamma_i(a_{h(i)} + a_{h'(i)}) \\ &= \sum_j \left(\sum_{f(i)=j} \alpha_i + \sum_{f'(i)=j} \alpha_i + \sum_{g(i)=j} \beta_i + \sum_{g'(i)=j} \beta_i + \sum_{h(i)=j} \gamma_i + \sum_{h'(i)=j} \gamma_i \right) a_j = \sum_j a_j \end{aligned} \quad (5)$$

である。 $J_i(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ を次のようにおく。

$$J_i(\ell_1, \ell_2, \ell_3) = q^{\alpha_i \ell_1 + \beta_i \ell_2 + \gamma_i \ell_3} I(\ell_1, \ell_2, \ell_3).$$

(1) と (4) より、

$$J_i(\ell_1, \ell_2, \ell_3) = J_i(\ell_1 + 2c, \ell_2 + 2c, \ell_3 + 2c)$$

である。よって、(5) により、

$$I(M) = \sum_{\substack{a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z} \\ a_j = 0}} \prod_i J_i(a_{f(i)} + a_{f'(i)}, a_{g(i)} + a_{g'(i)}, a_{h(i)} + a_{h'(i)}) \quad (6)$$

であることがわかる。

(3) と (4) より、

$$\deg J_i(\ell_1, \ell_2, \ell_3) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ell_2 - \ell_1)(\ell_3 - \ell_1) + \beta_i(\ell_2 - \ell_1) + \gamma_i(\ell_3 - \ell_1) & \text{if } \ell_1 \leq \ell_2 \text{ and } \ell_1 \leq \ell_3, \\ \frac{1}{2}(\ell_1 - \ell_2)(\ell_3 - \ell_2) + \alpha_i(\ell_1 - \ell_2) + \gamma_i(\ell_3 - \ell_2) & \text{if } \ell_2 \leq \ell_1 \text{ and } \ell_2 \leq \ell_3, \\ \frac{1}{2}(\ell_1 - \ell_3)(\ell_2 - \ell_3) + \alpha_i(\ell_1 - \ell_3) + \beta_i(\ell_2 - \ell_3) & \text{if } \ell_3 \leq \ell_1 \text{ and } \ell_3 \leq \ell_2 \end{cases}$$

である。とくに、定数 $\delta > 0$ が存在して、

$$\deg J_i(\ell_1, \ell_2, \ell_3) \begin{cases} \geq 0 & \text{if } \ell_1 = \ell_2 = \ell_3, \\ \geq \delta & \text{otherwise} \end{cases}$$

であることがわかる。このことより、(6) の和を一定の次数以下の部分に制限すると、その和は有限和になることがわかる。よって、3D index の定義式 (2) の右辺の和は収束する。 $\square$

この証明からわかるように、(6) において和をとる範囲である $\mathbb{Z}^m / \mathbb{Z}$ 上の関数として「和をとられる部分」の最低次元が“下に凸 (のような形)” であることが、 M の双曲構造から導かれ、そのことから $\mathbb{Z}[[q]]$ における和の収束性が導かれる。3D index は、状態和という量子トポロジー的な手法で定義されるが、(典型的な場合として) 3次元双曲多様体に対して定義される、ということは、3D index は「3次元双曲多様体の量子トポロジー」を構築する一員であることを示唆しているようにおもわれる。

また、 $I(M)$ が M の位相不変量であることについて [2, 6] を参照されたい。

2 $I(M_n(K))$ の係数は、十分大きい n で、 n の多項式であること

この節では、 $I(M_n(K))$ の次数 d の係数は、十分大きい n で、 n の $2d$ 次以下の多項式であること、について述べる。定理の証明など詳細について [5] を参照されたい。

K を双曲結び目とする。 K の補空間 $S^3 - K$ の双曲構造を与えるような $S^3 - K$ の理想 4 面体分割があると仮定する³。 $M_n(K)$ を $S^3 - K$ の n 重被覆空間として、 $S^3 - K$ の理想 4 面体分割のリフトとして、 $M_n(K)$ の理想 4 面体分割を考える。 $I(M_n(K))$ の係数を

$$I(M_n(K)) = 1 + c_1^{(n)}(K)q + c_2^{(n)}(K)q^2 + \cdots \in \mathbb{Z}[[q]]$$

のようにおく。十分大きい n に対する $I(M_n(K))$ の小さい次数の部分の値の挙動について、次の定理が成り立つ。

定理 2.1. 任意の正の整数 d に対して、正の整数 n_0 と次数 $2d$ 以下の n の多項式 $p_d^K(n)$ が存在して、

$$c_d^{(n)}(K) = p_d^K(n) \quad \text{for any } n \geq n_0$$

が成り立つ。

定理の $p_d^K(n)$ を用いて、 $\tilde{I}_K(n, q)$ を次のように定める。

$$\tilde{I}_K(n, q) = 1 + p_1^K(n)q + p_2^K(n)q^2 \cdots \in \mathbb{Z}[n][[q]].$$

標語的に言うと、これが “ $S^3 - K$ の無限巡回被覆の「同変 3D index」(の stable part)” とみなしたいということを念頭においている。

4₁ 結び目の場合

定理 2.2.

$$p_1^{4_1}(n) = 0, \quad p_2^{4_1}(n) = 0, \quad p_3^{4_1}(n) = 0.$$

であり、よって、

$$\tilde{I}_{4_1}(n, q) = 1 + O(q^4)$$

である。

$I(M_n(4_1))$ の具体的な値は次のように与えられる。

$$\begin{aligned} I(M_1(4_1)) &= 1 - 2q - 3q^2 + 2q^3 + 8q^4 + 18q^5 + 18q^6 + 14q^7 + O(q^8), \\ I(M_2(4_1)) &= 1 + 2q^2 + 8q^3 - 3q^4 - 32q^5 - 66q^6 - 56q^7 + O(q^8), \\ I(M_3(4_1)) &= 1 - 2q^3 - 18q^4 - 6q^5 + 138q^6 + 306q^7 + O(q^8), \\ I(M_4(4_1)) &= 1 + 2q^4 + 32q^5 + 48q^6 - 424q^7 + O(q^8), \\ I(M_5(4_1)) &= 1 - 2q^5 - 50q^6 - 160q^7 + O(q^8), \\ I(M_6(4_1)) &= 1 + 2q^6 + 72q^7 + O(q^8), \\ I(M_7(4_1)) &= 1 - 2q^7 + O(q^8), \\ I(M_8(4_1)) &= 1 + O(q^8). \end{aligned} \tag{7}$$

³前述したように、この仮定は、以下の記述を簡単にするための仮定であり、この仮定がなくても以下の内容は成立する。

この値は下3角の領域の係数が0になるという顕著な特徴をもつことが観察される。その特徴が任意の n で成立することは、後述する定理 3.1 を用いると、導出することができる。また、小さい次数で定理 2.1 が成立することは次のように確かめられる。

$$\begin{aligned} c_1^{(n)}(4_1) &= p_1^{4_1}(n) && \text{for any } n \geq 2, \\ c_2^{(n)}(4_1) &= p_2^{4_1}(n) && \text{for any } n \geq 3, \\ c_3^{(n)}(4_1) &= p_3^{4_1}(n) && \text{for any } n \geq 4. \end{aligned}$$

5₂ 結び目の場合

定理 2.3.

$$p_1^{5_2}(n) = n(n-2), \quad p_2^{5_2}(n) = \frac{1}{4}n(n^3 - 6n^2 + n + 36)$$

であり、よって、

$$\tilde{I}_{5_2}(n, q) = 1 + n(n-2)q + \frac{1}{4}n(n^3 - 6n^2 + n + 36)q^2 + O(q^3)$$

である。

$I(M_n(5_2))$ の具体的な値は次のように与えられる。

$$\begin{aligned} I(M_1(5_2)) &= 1 - 4q - q^2 + 16q^3 + 26q^4 + O(q^5), \\ I(M_2(5_2)) &= 1 + 14q^2 + 6q^3 - 107q^4 + O(q^5), \\ I(M_3(5_2)) &= 1 + 3q + 15q^2 - 82q^3 - 24q^4 + O(q^5), \\ I(M_4(5_2)) &= 1 + 8q + 8q^2 - 72q^3 + O(q^4), \\ I(M_5(5_2)) &= 1 + 15q + 20q^2 + 45q^3 + O(q^4), \\ I(M_6(5_2)) &= 1 + 24q + 63q^2 + 216q^3 + O(q^3), \\ I(M_7(5_2)) &= 1 + 35q + 161q^2 + 546q^3 + O(q^3), \\ I(M_8(5_2)) &= 1 + 48q + 344q^2 + 1248q^3 + O(q^3). \end{aligned}$$

小さい次数で定理 2.1 が成立することは次のように確かめられる。

$$\begin{aligned} c_1^{(n)}(5_2) &= p_1^{5_2}(n) && \text{for any } n \geq 2, \\ c_2^{(n)}(5_2) &= p_2^{5_2}(n) && \text{for any } n \geq 4. \end{aligned}$$

3 遷移行列の固有値を用いた $I(M_n(K))$ の値の表示

この節では、遷移行列 $\mathcal{M}$ の固有値を用いて $I(M_n(K))$ の値を表示することができることの概要について述べる。この $\mathcal{M}$ は“無限次元の行列”であることに注意する。定理の証明など、詳細について [5] を参照されたい。

4₁ 結び目の場合

4₁ 結び目の補空間の理想 4 面体分割を、 $M_n(4_1)$ の理想 4 面体分割にリフトして、3D index の定義を適用することにより、 $I(M_n(4_1))$ の値は次のように表示される。

$$\begin{aligned} I(M_n(4_1)) &= \sum J_{4_1}(a_0+a_3, 2a_1, 2a_2) J_{4_1}(a_1+a_4, 2a_2, 2a_3) \\ &\quad \times J_{4_1}(a_2+a_5, 2a_3, 2a_4) J_{4_1}(a_3+a_6, 2a_4, 2a_5) \\ &\quad \times \cdots \\ &\quad \times J_{4_1}(a_{2n-2}+a_{2n+1}, 2a_{2n-1}, 2a_{2n}) J_{4_1}(a_{2n-1}+a_{2n+2}, 2a_{2n}, 2a_{2n+1}). \end{aligned}$$

ここで、 a_i の添字は “mod $2n$ ” で考え、和の範囲は

$$a_0 = 0, \quad a_1, \dots, a_{2n-1} \in \mathbb{Z}$$

のようにとる。 a'_k を

$$a'_k = a_k - a_{k-1}$$

のようにおくことにより、和の範囲は

$$a'_0, a'_1, \dots, a'_{2n-1} \in \mathbb{Z}, \quad a'_0 + a'_1 + \cdots + a'_{2n-1} = 0$$

のよう書き直される。さらに、 u を変数として、 $\mathcal{M}_{(a'_3, a'_4)}^{(a'_1, a'_2)}$ を

$$\mathcal{M}_{(a'_3, a'_4)}^{(a'_1, a'_2)} = J_{4_1}(a_0+a_3, 2a_1, 2a_2) J_{4_1}(a_1+a_4, 2a_2, 2a_3) u^{a'_2+a'_3}$$

のようにおく。ここで、 u のべきは $a'_2 + a'_3 + \cdots$ の値をかぞえており、その値の情報を $\mathcal{M}_{(a'_3, a'_4)}^{(a'_1, a'_2)}$ の中に記録するために u という変数を導入している。また、 $J_{4_1}(\ell_1+2, \ell_2+2, \ell_3+2) = J_{4_1}(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ であることより、上式の右辺は a'_1, a'_2, a'_3, a'_4 にしかよらないことに注意する。さらに、 $\mathcal{M}_{(a'_3, a'_4)}^{(a'_1, a'_2)}$ を成分にする $\mathcal{M}$ を

$$\mathcal{M} = \left(\mathcal{M}_{(a'_3, a'_4)}^{(a'_1, a'_2)} \right)$$

のよう定める。2つの $\mathcal{M}$ の積は

$$\mathcal{M}^2 = \left(\sum_{a'_3, a'_4} \mathcal{M}_{(a'_3, a'_4)}^{(a'_1, a'_2)} \mathcal{M}_{(a'_5, a'_6)}^{(a'_3, a'_4)} \right)$$

で与えられる (積の成分の値の和が収束することは自明ではない)。ここで、パラメータ同士の関係は次のようになっている。

すなわち、 a'_3, a'_4 に関して $\mathcal{M}_{(a'_3, a'_4)}^{(a'_1, a'_2)} \mathcal{M}_{(a'_5, a'_6)}^{(a'_3, a'_4)}$ の和をとることにより、 $\mathcal{M}^2$ の成分 $(\mathcal{M}^2)_{(a'_5, a'_6)}^{(a'_1, a'_2)}$ が得られる。このことを拡張することにより、 $I(M_n(4_1))$ の値は

$$I(M_n(4_1)) = ((\text{trace } \mathcal{M}^n) \text{ の値における } u^0 \text{ の係数})$$

のように表される。

次数が小さい部分の $\mathcal{M}$ の固有値は次のように求められる。

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 1 + O(q^{15/2}), \\ \lambda_2 &= -q + q^{3/2}(u + u^{-1}) + q^2(-1 + \sqrt{-1}(u + u^{-1})) \\ &\quad - q^{5/2}\sqrt{-1}\left(1 + \frac{1}{2}(u^2 + u^{-2})\right) \\ &\quad + q^3\left(\frac{1}{2}(u^2 + u^{-2}) + \frac{9\sqrt{-1}}{8}(u + u^{-1}) - \frac{\sqrt{-1}}{8}(u^3 + u^{-3})\right) \\ &\quad + q^{7/2}\left(-2(u + u^{-1}) - \frac{7\sqrt{-1}}{8} + \frac{\sqrt{-1}}{2}(u^2 + u^{-2}) - \frac{\sqrt{-1}}{16}(u^4 + u^{-4})\right) \\ &\quad + q^4\sqrt{-1}\left(\frac{51}{64}(u + u^{-1}) + \frac{31}{128}(u^3 + u^{-3}) - \frac{5}{128}(u^5 + u^{-5})\right) + O(q^{9/2}), \\ \lambda_3 &= \bar{\lambda}_2, \\ \lambda_4 &= q^2 e^{2\pi\sqrt{-1}/3} + O(q^{5/2}), \\ \lambda_5 &= \bar{\lambda}_4. \end{aligned}$$

定理 3.1. $I(M_n(4_1))$ の値は、固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_5$ を用いて、

$$I(M_n(4_1)) = \left((\lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_3^n + \lambda_4^n + \lambda_5^n) \text{ の値における } u^0 \text{ の係数} \right) + O(q^{\min\{2n+1, 8\}})$$

のように表示される。

定理の帰結として、前述したように、(7) の下 3 角の領域の係数が 0 になることがわかる。

5₂ 結び目の場合

5₂ 結び目に対して、前述の場合と同様にして、

$$\mathcal{M}_{(b'_1, a'_2)}^{(b'_0, a'_1)} = \sum_{c'_0 \in \mathbb{Z}} J_{5_2}(a_0+c_0, c_0+b_0, a_1+b_1) J_{5_2}(a_2+c_0, c_0+b_1, a_1+b_0) J_{5_2}(b_0+b_1, a_1+c_0, a_0+a_2) u^{a'_1}$$

とおく。ここで、変数 u のべきは $a'_1 + a'_2 + \dots$ の値をかぞえている。また、 $J_{5_2}(\ell_1+2, \ell_2+2, \ell_3+2) = J_{5_2}(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ であることより、上式の右辺の値は b'_0, a'_1, b'_1, a'_2 にしかよらないことに注意する。さらに、 $\mathcal{M}_{(b'_1, a'_2)}^{(b'_0, a'_1)}$ を成分とする $\mathcal{M}$ を

$$\mathcal{M} = \left(\mathcal{M}_{(b'_1, a'_2)}^{(b'_0, a'_1)} \right)$$

のように定める。2つの $\mathcal{M}$ の積は

$$\mathcal{M}^2 = \left(\sum_{b'_1, a'_2} \mathcal{M}_{(b'_1, a'_2)}^{(b'_0, a'_1)} \mathcal{M}_{(b'_2, a'_3)}^{(b'_1, a'_2)} \right)$$

で与えられる。ここで、パラメータ同士の関係は次のようになっている。

よって、前述の場合と同様にして、 $I(M_n(5_2))$ の値は

$$I(M_n(5_2)) = ((\text{trace } \mathcal{M}^n) \text{ の値における } u^0 \text{ の係数})$$

のように表される。

次数が小さい部分の $\mathcal{M}$ の固有値は次のように求められる。

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 1 + q^{1/2}(u + u^{-1}) + q(-1 + u^2 + u^{-2}) + q^{3/2}(-2(u + u^{-1}) + u^3 + u^{-3}) \\ &\quad + q^2(8 + u^4 + u^{-4}) + q^{5/2}(-5(u + u^{-1}) + u^5 + u^{-5}) \\ &\quad + q^3(-19 - 12(u^2 + u^{-2}) + u^6 + u^{-6}) + O(q^{7/2}), \\ \lambda_2 &= 2^{1/3}q^{3/2} - 1 + \frac{2}{3}q^{3/2}(u + u^{-1}) + \frac{1}{2^{1/3}}q^{5/2} + O(q^{11/6}), \\ \lambda_3 &= 2^{1/3}e^{2\pi\sqrt{-1}/3}q^{3/2} - 1 + \frac{2}{3}q^{3/2}(u + u^{-1}) + \frac{e^{-2\pi\sqrt{-1}/3}}{2^{1/3}}q^{5/3} + O(q^{11/6}), \\ \lambda_4 &= 2^{1/3}e^{-2\pi\sqrt{-1}/3}q^{3/2} - 1 + \frac{2}{3}q^{3/2}(u + u^{-1}) + \frac{e^{2\pi\sqrt{-1}/3}}{2^{1/3}}q^{5/3} + O(q^{11/6}). \end{aligned}$$

定理 3.2. $I(M_n(5_2))$ の値は、固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ を用いて、

$$I(M_n(5_2)) = \left((\lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_3^n + \lambda_4^n) \text{ の値における } u^0 \text{ の係数} \right) + \begin{cases} O(q^2) & \text{if } n = 1, \\ O(q^3) & \text{if } n = 2, 3, 4, \\ O(q^4) & \text{if } n \geq 5 \end{cases}$$

のように表示される。

“ S^3-K の無限巡回被覆の「同変 3D index」” という標語的な観点で言うと、“固有値の列 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ ” が「同変 3D index」に相当する。別の言い方をすると、 $\mathcal{M}$ の特性多項式

$$(t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdot \dots$$

を「同変 3D index」とみなすことができそうであるが、上式の無限積は収束しないので、その無限積が収束するように $t^{-1} = T$ とおいてそれを書きかえた

$$(1 - T\lambda_1)(1 - T\lambda_2) \cdot \dots$$

を「同変 3D index」とみなすのがよいようにおもわれる。

References

- [1] Dimofte, T., Gaiotto, D., Gukov, S., *3-manifolds and 3d indices*, Adv. Theor. Math. Phys. **17** (2013) 975–1076.
- [2] Garoufalidis, S., Kashaev, R., *A meromorphic extension of the 3D index*, Res. Math. Sci. **6** (2019) Paper No. 8, 34 pp.
- [3] Garoufalidis, S., Wheeler, C., *Periods, the meromorphic 3D-index and the Turaev–Viro invariant*, arXiv:2209.02843.
- [4] Hodgson, C. D., Kriker, A. J., Siejakowski, R. M., *On the asymptotics of the meromorphic 3D-index*, arXiv:2109.05355.
- [5] Ohtsuki, T., *On the 3D-index of finite cyclic covers of hyperbolic knot complements*, RIMS preprint, 2023. <https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/preprint/file/RIMS1971.pdf>
- [6] 大槻知忠、満淵俊樹、亀谷幸生、「幾何学と物理」、幾何学百科 IV、朝倉書店、2023 年 12 月。

Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8502, Japan
E-mail address: tomotada@kurims.kyoto-u.ac.jp