高校生のための大学数学講座

複素関数論

1. 複素微分と正則関数
2. 複素積分とコーシーの積分定理

大島利雄

城西大学 数理・データサイエンスセンター

<https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~oshima/index-j.html>

NHK 文化センター青山教室

2022年9月4日

$f(z)$: 複素平面 $\mathbb{C}$ 内の領域 U 上の正則関数

U 内の各点 c の近く (近傍) で収束べき級数で表せる

$$f(z) = a_0 + a_1(z - c) + a_2(z - c)^2 + \cdots + a_n(z - c)^n + \cdots$$

整関数 : 複素平面全体で正則な関数, たとえば多項式, e^z , $\sin z$

導関数 : $f'(z) = a_1 + 2a_2(z - c) + \cdots + na_n(z - c)^{n-1} + \cdots$

原始関数 : $F(z) = C + a_0(z - c) + \frac{a_1}{2}(z - c)^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}(z - c)^{n+1} + \cdots$

実関数の積分

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\gamma'(t)dt = F(b) - F(a)$$

$$\gamma : [\alpha, \beta] \mapsto \mathbb{R}, \quad \gamma(\alpha) = a, \quad \gamma(\beta) = b$$

$$a = t_0 < t_1 = a + \frac{b-a}{N} < \cdots < t_j = \alpha + \frac{j(b-a)}{N} < \cdots < t_N = b$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\gamma'(t)dt = \sum_{j=0}^{N-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(\gamma(t))\gamma'(t)dt$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{N-1} f(\gamma(t_j))\gamma'(t_j)(t_{j+1} - t_j)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{N-1} f(\gamma(t_j)) (\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j)) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{N-1} F_j(\gamma(t_{j+1})) - F_j(\gamma(t_j)) = F(b) - F(a)
\end{aligned}$$

和の各項の差は $o(\frac{1}{N})$ の誤差

$\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ が、 $f(z)$ の一つの収束円の中に入っていれば、 γ が $\mathbb{C}$ 内の曲線 C であっても正しい

複素積分. γ が複素平面内の曲線 C で、 $f(z)$ はその曲線に沿って正則とする

複素積分

$$\int_C f(z) dz$$

が同様に定義できる

原始関数 F は収束円内では存在するので、 N を大きく取り、曲線を細分して、 $F'_j = f$ となる F_j を使って定義してもよい。 F_j の差は定数なので、 F_j の取り方に依らない

$$|f(z)| \leq M \quad (z \in C) \Rightarrow \left| \int_C f(z) dz \right| \leq M|C| \quad (|C| \text{ は曲線 } C \text{ の長さ})$$

$-C$ は $-\gamma : [-\beta, -\alpha] \ni t \mapsto \gamma(-t) \in \mathbb{C}$ で定義される曲線 (向きが逆)

$$\int_{-C} f(z)dz = - \int_C f(z)dz$$

収束円内部では, 積分の値は, 曲線の取り方によらず曲線の始点と終点で決まる

コーシーの積分定理. 積分路の始点と終点を固定しておけば, 正則領域 U 内で曲線を連続変形しても積分値は変わらない. 特に, 閉曲線 C の場合, それが領域内で一点に変形できれば

$$\int_C f(z)dz = 0$$

$$C : a \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow b \rightarrow \tilde{e}_2 \rightarrow \tilde{e}_1 \rightarrow a$$

$$C_1 : a \rightarrow \underline{e_1} \rightarrow \underline{\tilde{e}_1} \rightarrow a$$

$$C_2 : e_1 \rightarrow \underline{e_2} \rightarrow \underline{\tilde{e}_2} \rightarrow \underline{\tilde{e}_1} \rightarrow e_1$$

$$C_3 : e_2 \rightarrow b \rightarrow \underline{\tilde{e}_2} \rightarrow e_2$$

$$\int_{C_\gamma} - \int_{C_{\tilde{\gamma}}} = \int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} = 0$$

閉曲線 : 始点と終点が同じ曲線

単純閉曲線 : 自分自身と交わらない閉曲線. 反時計回りの向き (標準)

重要な例

$$\gamma : [0, 2\pi] \ni t \mapsto c + re^{it} \in \mathbb{C}, \quad \gamma'(t) = rie^{it}$$

$$\begin{aligned} \int_{|z-c|=r} \frac{dz}{(z-c)^n} &= \int_0^{2\pi} \frac{rie^{it}}{(re^{it})^n} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{ie^{(1-n)it}}{r^{n-1}} dt \\ &= \begin{cases} \left[\frac{e^{(1-n)it}}{r^{n-1}(1-n)} \right]_{t=0}^{t=2\pi} = 0 & (n \neq 1) \\ 2\pi i & (n = 1) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dz} \frac{(z-c)^{1-n}}{1-n} = (z-c)^{-n} \quad : \text{原始関数}$$

$$\frac{d}{dz} \log(z-c) = \frac{1}{z-c} \quad \Rightarrow$$

$$\int_{|z-c|=r} \frac{dz}{z-c} = \left[\log(re^{it}) \right]_{t=0}^{t=2\pi} = \left[\log r + it \right]_{t=0}^{t=2\pi} = 2\pi i$$

$$\int_{|z-c|=r} \frac{dz}{(z-c)^n} = \begin{cases} 0 & (n : \text{整数}, n \neq 1) \\ 2\pi i & (n = 1) \end{cases}$$

コーシーの積分公式. $f(z)$ は単純閉曲線 C とその内部領域 V で正則ならば

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-w} dz \quad (w \in V)$$

$$\tilde{C} := C + L_{a \rightarrow b} - C_{|z-w|=r} - L_{a \rightarrow b}$$

$$\int_{\tilde{C}} = 0 \Rightarrow \int_C = \int_{|z-w|=r}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-w} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-w|=r} \frac{f(z) - f(w)}{z-w} dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-w|=r} \frac{f(w)}{z-w} dz = f(w)$$

$$C : |z - c| = R, \quad |w - c| < R \Rightarrow$$

$$\frac{1}{z-w} = \frac{1}{(z-c) - (w-c)} = \frac{1}{z-c} \frac{1}{1 - \frac{w-c}{z-c}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z-c} \left(\frac{w-c}{z-c} \right)^n$$

$$f(w) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-c|=R} \frac{f(z)}{(z-c)^{n+1}} dz \right) (w-c)^n$$

$\overline{D_R(c)} := \{z \in \mathbb{C}; |z - c| \leq R\} \subset U \Rightarrow c$ でのべき級数は収束半径が R 以上
 U 上の正則関数の異なる導入 :

U 内の各点で複素微分可能 $\Rightarrow$ コーシーの積分定理 $\Rightarrow$ 収束べき級数で表せる

$$a_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

リウヴィルの定理. 適当な非負整数 n と整数 M 対して $|f(z)| \leq M(|z|^n + 1)$ を満たす整関数 $f(z)$ は n 次以下の多項式となる. 特に有界な整関数は定数となる

$$m > n \Rightarrow |a_m| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{m+1}} dz \right| \leq \frac{M(R^n + 1)}{2\pi R^{m+1}} 2\pi R \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

代数学の基本定理. $n (> 0)$ 次の多項式 $f(z)$ に対し, $f(c) = 0$ を満たす $c \in \mathbb{C}$ が存在する

そのような c が存在しないとすると, $\frac{1}{f(z)}$ は整関数で $\lim_{|z| \rightarrow \infty} \frac{1}{f(z)} = 0$ を満たし, 複素平面上で有界で定数となって矛盾

孤立特異点におけるローラン展開. $f(z) : D_R(c) \setminus \{c\}$ で正則. このとき

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - c)^n \quad (|z - c| < R), \quad a_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-c|=r} \frac{f(z)dz}{(z - c)^{n+1}}$$

$c = 0$ とする. $0 < r_2 < |w| < r_1 < R$, $a = r_1$, $b = r_2$

$$C := C_{|z|=r_1} + L_{a \rightarrow b} - C_{|z|=r_2} + L_{b \rightarrow a}$$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)dz}{z - w} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r_1} \frac{f(z)dz}{z - w} - \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r_2} \frac{f(z)dz}{z - w}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n w^n \quad \left(a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{f(z)dz}{z^{n+1}}, \quad n = -m - 1 \right)$$

$$\frac{1}{z - w} = \frac{1}{z(1 - \frac{w}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z} \left(\frac{w}{z} \right)^n \quad (|w| < |z| = r_1)$$

$$= -\frac{1}{w(1 - \frac{z}{w})} = -\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{w} \left(\frac{z}{w} \right)^m \quad (|z| = r_2 < |w|)$$

$a_n \neq 0$ となる最小の n を c における**零点の位数**, $-n$ を**極の位数**という. $n \geq 0$ のとき**除ける特異点**, $n = -\infty$ のとき**真性特異点**, $-\infty < n < 0$ のとき**極**という

孤立特異点における留数

$$\text{Res}(f, c) := a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-c|=r} f(z) dz$$

$f(z)$ が $z = c$ を $m (\geq 1)$ 位の極とするとき

$$\text{Res}(f, c) = \left[\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \frac{(z-c)^m f(z)}{(m-1)!} \right]_{z \rightarrow c}$$

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z-c)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z-c} + a_0 + a_1(z-c) + \cdots$$

$g(z), h(z)$ が $z = c$ で正則で, $g(z)$ が $z = c$ を一位の零点とするとき

$$\text{Res}\left(\frac{h}{g}, c\right) = \frac{h(c)}{g'(c)}$$

留数定理. $f(z)$: 単純閉曲線 C とその内部で m 個の孤立特異点 $\{c_1, \dots, c_m\}$ を除いて正則ならば

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^m \text{Res}(f, c_j)$$

$$\int_{|z|=1} \frac{f(z)dz}{iz} = \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})d\theta \quad (z = e^{i\theta}, \frac{de^{i\theta}}{d\theta} = ie^{i\theta} = iz)$$

$$\begin{aligned} r^2 + 2r \cos \theta + 1 &= r^2 + r(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) + 1 = r^2 + r(z + \frac{1}{z}) + 1 \\ &= z^{-1}(rz^2 + (r^2 + 1)z + r) \\ &= z^{-1}(rz + 1)(z + r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{r^2 + 2r \cos \theta + 1} &= \int_{|z|=1} \frac{dz}{i(rz + 1)(z + r)} \\ &= \begin{cases} 2\pi i \lim_{z \rightarrow -r} \frac{z + r}{i(rz + 1)(z + r)} = \frac{2\pi}{1 - r^2} & (|r| < 1) \\ 2\pi i \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{r}} \frac{z + \frac{1}{r}}{i(rz + 1)(z + r)} = \frac{2\pi}{r^2 - 1} & (|r| > 1) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos rx}{x^2 + 1} dx = \pi e^{-|r|} \quad (r : \text{実数})$$

$$C_R^+ := \{Re^{i\theta} ; \theta \in [0, \pi]\}$$

$$\tilde{C}_R := L_{-R \rightarrow R} + C_R^+$$

$$\int_{\tilde{C}_R^+} \frac{e^{i|r|z} dz}{z^2 + 1} = 2\pi i \text{Res}\left(\frac{e^{i|r|z}}{z^2 + 1}, i\right) = 2\pi i \cdot \left[\frac{e^{i|r|z}}{2z}\right]_{z=i} = \pi e^{-|r|}$$

$$= \int_{-R}^R \frac{\cos rx}{x^2 + 1} dx + \int_{C_R^+} \frac{e^{i|r|z}}{z^2 + 1} dz$$

$$\left| e^{i|r|R(\cos \theta + i \sin \theta)} \right| = \left| e^{i|r|R \cos \theta - |r|R \sin \theta} \right| \leq 1 \quad (\theta \in [0, \pi])$$

$$\left| \int_{C_R^+} \frac{e^{i|r|z} dz}{z^2 + 1} \right| \leq \frac{\pi R}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} &= 2\pi i \cdot \text{Res}\left(\frac{1}{(z^2 + 1)^2}, i\right) = 2\pi i \left[\frac{d}{dz} \frac{(z - i)^2}{(z^2 + 1)^2} \right]_{z \rightarrow i} \\ &= 2\pi i \left[\frac{d}{dz} \frac{1}{(z + i)^2} \right]_{z \rightarrow i} = 2\pi i \left[\frac{-2}{(z + i)^3} \right]_{z \rightarrow i} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$z^4 + 1 = (z - e^{\frac{\pi i}{4}})(z - e^{\frac{3\pi i}{4}})(z - e^{\frac{5\pi i}{4}})(z - e^{\frac{7\pi i}{4}})$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} &= 2\pi i \cdot \text{Res}\left(\frac{1}{z^4 + 1}, e^{\frac{\pi i}{4}}\right) + 2\pi i \cdot \text{Res}\left(\frac{1}{z^4 + 1}, e^{\frac{3\pi i}{4}}\right) \\ &= 2\pi i \left(\left[\frac{1}{4z^3} \right]_{z=e^{\frac{\pi i}{4}}} + \left[\frac{1}{4z^3} \right]_{z=e^{\frac{3\pi i}{4}}} \right) = \frac{\pi i}{2} (e^{-\frac{3\pi i}{4}} + e^{-\frac{9\pi i}{4}}) \\ &= \frac{\pi}{2} (e^{\frac{\pi i}{2}} e^{-\frac{3\pi i}{4}} + e^{\frac{\pi i}{2}} e^{-\frac{9\pi i}{4}}) = \frac{\pi}{2} (e^{-\frac{\pi}{4}i} + e^{\frac{\pi}{4}i}) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

定理. $f(z)$ は単純閉曲線 C とその内部で正則で, C 上で零にならないとする.
このとき $f(z)$ の C 内の零点の個数は以下で与えられる (重複度込み)

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

$f(z) = a_m(z - c)^m + a_{m+1}(z - c)^{m+1} + \dots \Rightarrow \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - c} + b_0 + b_1(z - c) + \dots$
となるので, $\text{Res}\left(\frac{f'}{f}, c\right) = m$. $\left(\frac{1}{1 - zg(z)} = 1 + zg(z) + z^2(g(z))^2 + \dots\right)$

ルーシェの定理. $f(z), g(z)$ は単純閉曲線 C とその内部で正則で, C 上では $|f(z)| > |g(z)|$ が成り立つとする. このとき C 内の $f(z)$ の零点の個数と $f(z) + g(z)$ の零点の個数は等しい

$$h(z) = 1 + \frac{g(z)}{f(z)} = \frac{f(z) + g(z)}{f(z)} \text{ とおくと}$$

$$\frac{f'(z) + g'(z)}{f(z) + g(z)} = (\log(f(z) + g(z)))' = (\log(f(z)) + \log(h(z)))' = \frac{f'(z)}{f(z)} + \frac{h'(z)}{h(z)}$$

曲線 C を $\gamma : [\alpha, \beta] \mapsto \gamma(t) \in \mathbb{C}$ とするとき, 曲線 Γ を $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \mapsto h(\gamma(t)) \in \mathbb{C}$ とする

$$\int_C \frac{h'(z)}{h(z)} dz = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{h'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)}{h(\gamma(t))} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\tilde{\gamma}'(t)}{\tilde{\gamma}(t)} dt = \int_{\Gamma} \frac{dw}{w}$$

Γ は 1 を中心とする半径 1 の円内の閉曲線なので, 上の値は 0

よって前定理からルーシェの定理が分かる

適用例 : $f(z) = z^n, g(z)$ は $(n - 1)$ 次以下の多項式, $C : |z| = R$ は大きな円

- $z^5 + z^4 + z^2 + 1 = 0$ は, $\frac{1}{2} < |z| < 2$ の範囲に解を 5 つ持つ
- $2z^n = \sin z$ を満たす $z \in \mathbb{C}$ は $|z| < 1$ の範囲で n 個ある